

**Van megoldás a pettyesszárnyú muslica (*Drosophila suzukii*) ellen!**

## **Exirel® SE rovarölő szer**

**Rovarölő permetezőszer meggy- és cseresznyekultúrában *Drosophila suzukii* (pettyesszárnyú vagy foltosszárnyú muslica) ellen.**

Szükséghelyzeti engedély (KITE Zrt.): 6300/13667-2/2019 NÉBIH.

Felhasználható: 2019. május 20-tól 2019. augusztus 4-ig

A piacképes cseresznye és meggy termesztése kellő gondosságot igényel növekedésük legérzékenyebb szakaszaiban. A Cyazypyr® hatóanyagú Exirel® SE rovarölő szer segít megvédeni a cseresznyét és a meggyet a kritikus növekedési stádiumban, hogy a maximális értékesíthető termést szüretelhesse le.

A *Drosophila suzukii* súlyosan károsíthatja a növényeket, jelentős gazdasági kárt eredményezve a cseresznye- és meggytermesztők számára. E kártevő irtására nem sok megoldás létezik. A Cyazypyr® hatóanyagú Exirel® SE rovarölő szer új hatásmechanizmust biztosít a *Drosophila suzukii* irtására (IRAC csoport: 28), így egy új, rendkívül hatékony növényvédelmi eszközt ad a termelők kezébe.



*Kezeletlen és Exirel® rovarölő szerrel kezelt cseresznye*

### **Felhasználásra vonatkozó előírások**

Felhasználható **cseresznyében és meggyben** *Drosophila suzukii* (pettyesszárnyú vagy foltosszárnyú muslica) ellen a **virágzást követő és a gyümölcsszíneződési és érési időszakban** előrejelzés és növényvizsgálat alapján **maximum kettő alkalommal 0,75 l/ha dózisban**. A koronamagasság ismeretében a **felhasznált permetlé mennyisége 800-1000 l/ha**. A készítmény integrált termesztésű cseresznye- és meggyültetvényekben a hasznos szervezetek védelme mellett technológiába illeszthető.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.

## Védje meg az érő gyümölcsöt, hogy minőségi termést takaríthasson be

Az Exirel® SE rovarölő szert a gyümölcs érése során kell alkalmazni, a *Drosophila suzukii* populációkárosító küszöbértékének elérésekor.

Az Exirel® SE rovarölő szer hatékonyan irtja az imágókat, ami csökkenti a populációt és segít megelőzni a peterakást is. Az imágóra gyakorolt hatás eredményeképpen jelentős mértékben csökken a peterakás és a lárvák további kifejlődése, ami egyúttal korlátozza a további nemzedékek számát is. 3 napos élelmezésügyi várakozási ideje révén jól illeszthető a technológiába és az integrált növényvédelmi programokba is.




Javasolt felhasználási időzítés 10 napos intervallummal

Exirel®  
Insecticide

Exirel®  
Insecticide

## A biztos piacképes hozam lehetősége



Az Exirel® SE kezelés eredménye 20%-kal több megmentett gyümölcs (olaszországi vizsgálatok)

További termékinformációk ide kattintva érhetők el: [Exirel® SE rovarölő szer](#)

Videók a *Drosophila suzukii* elleni hatékonyságról [ide](#) és [ide](#) kattintva érhetők el vagy a csatolt QR kódokkal elérhetők.



Videó: Ismerjük meg a pettyesszárnyú muslicát!



Videó: A Cyazapyr® hatása a pettyesszárnyú muslicára

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.