




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe


Hajdú-Bihar megye növény-egészségügyi helyzetének alakulásáról a 2019.07.20.-07.27. közötti időszakra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az eltelt időszak időjárása:


Kánikulai meleg és heves zivatarok jellemezték az elmúlt hét időjárását. Megyén jelentős részén továbbra is az aszályos időjárás volt a jellemző.



www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/csapadek/



www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/




www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/homerseklet/

A várható időjárás:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ECMWF valószínűségi előrejelzése megyénkre:

Az előrejelzés az elkövetkezendő dekádra meleg zivatarokkal tarkított időjárást prognosztizál..



<https://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/valoszinusegi/>

Fenológiák:

Kukorica: virágzás befejeződése-hajbarnulás (67 BBCH)


Napraforgó: virágzás vége-magképződés (BBCH 69-70)

Alma: 90 %-os gyümölcsméret (BBCH 79)


Szántóföldi növények:

Kukorica:


A kukoricabogár (*Diabrotica virgifera virgifera*) nőtényei az elmúlt időszakban elkezdték a tömeges tojásrakást. A vizsgált nőtények közel felének a potroha már üres volt a fennmaradó részüknél pedig érett tojásoktól duzzadt. Az imágók a cső végi szemek megrágásával utat nyitnak a fuzárium fertőzés számára, amivel jelentős minőségi kárt okoznak. Az elmúlt héten a gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) második nemzedékének a rajzása befejeződött, ezért a védekezések elvégzése aktuálissá vált. A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) második nemzedék rajzása elkezdődött az elmúlt napokban. A 3-4 (5) levélemeleten is tömegese megfigyelhető kétfoltos takácsatka (*Tetranychus urticae*) kártétele, ezért az időjárás előrejelzést figyelembe véve célszerű a vetőmag kukorica előállításban a védekezésre felkészülni.




Kukoricabogár, Pocsaj




Kukoricabogár, Darvas



Kukoricabogár imágókártétel fotó: Dalmi Izabella



Gyapottok bagolylepke, Pocsaj



Gyapottok bagolylepke, Darvas

Napraforgó:

A napraforgó növényvédelmi helyzetében az előző héthez képest nem történt változás, a *Septoria helianthi* és az *Alternaria helianthi* szinte mindenütt megtalálható az alsó leveleken (levélemeleteken). Egyelőre a fehérpenész (*Sclerotinia sclerotiorum*) és a foma (*Phoma macdonaldii*) fertőzésre utaló tünetek mutató növények alacsony számban fordulnak elő. A meleg időjárás kedvez a (*Macrophomina phaseolina*) számára ezért, számolnunk kell a betegség megjelenésével

Debrecen, 2019. július 28.