




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe


Hajdú-Bihar megye növény-egészségügyi helyzetének alakulásáról a 2019.08.25.-09.01. közötti időszakra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az eltelt időszak időjárása:

Augusztus végi időjárás száraz, meleg aszályos volt megyénkben. A szakszerűen ápolt, lezárt tarlók még megfelelő nedvesség tartalmat, talajállapotot biztosítanak a repce vetéshez, az elhanyagolt tarlók viszont gyomosak és a vetésmélységben teljesen kiszáradtak.



www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/csapadek/




www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/talaj/

A várható időjárás:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ECMWF valószínűségi előrejelzése megyénkre:

Az előrejelzés szeptember első napjaira még 25 °C közeli középhőmérsékleti értékeket, majd ezt követően egy „évszakváltó” hidegfrontot követően lehűlést és pár mm csapadékot prognosztizál.



www.met.hu/idojaras/elorejelzes/valoszinusegi/

Fenológiaiák:

Kukorica: viaszérés (BBCH 85)

Napraforgó: citromérés-barnaérés (BBCH 85-89)

Alma: gyümölcserés a fajtára jellemző színeződés kialakult (BBCH 85)

Polifág kártevők:

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) jelenleg az évelő pillangós állományokban nincs csak a táblaszegélyekben haladja meg a gyenge (4 lakott járat/100m²) fertőzöttségi szintet.

Szántóföldi növények:

Kukorica:

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) még mindig nagy számban előfordul a csapdákból amit a Délről bevándorló valamint a helyi populáció rajzáskezdetek okoz. Az áru kukoricában az érés előrehaladott állapota miatt már nem okoz a gyapottok hernyó jelentős kárt, viszont a kora őszi betakarítású csemege kukoricában még komoly károkat okozhat. A kukoricamoly kártétele meggyénkben jellemzően alacsony (<20% károsított növény) de szórványosan előfordul a közepes (20-50% károsított növény) kártétel is. A kukoricánál is probléma a rovarkártételből adódó cső végi *Fusarium sp.* fertőzés mely a mikotoxinok miatt jelentősen csökkentheti a termés minőségét.



Kukoricamoly kártétel

fotó: Nagy László



Molyos cső

fotó:Nagy László

Napraforgó:

A napraforgó érése az elmúlt napok meleg száraz időjárása miatt jelentősen felgyorsult. A tányéron a meleg száraz idő miatt a szürkepenész (*Botrytis cinerea*) alig, viszont a *Rhizopus nigricans* szórványosan megjelent. A termelők jellemzően végeztek a deszikkálással.


Repce:

A jobb talajokon elkezdődött a repce vetése. A száraz időjárás miatt erős repcebolha kártételre kell számítanunk ezért a rovarölő szeres csávázás ellenére célszerű az állománykezelésre is felkészülni.

Alma.

Az elmúlt hét időjárása az alma érését is felgyorsította a korai fajták betakarítása megkezdődött.

Az Almalevél-sátorosmoly tömegesen jelen van a csapdákban a nemzedékek az elhúzódó rajzás miatt már nem különíthetők el. Az almamoly (*Cydia pomonella*), az almalevél-aknázómoly (*Lithocolletis blancardella*) rajzása befejeződött.



Almalevél-sátorosmoly, Debrecen

Debrecen, 2019. szeptember 3.