




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe


Hajdú-Bihar megye növény-egészségügyi helyzetének alakulásáról a 2019.09.09.-09.15. közötti időszakra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az eltelt időszak időjárása:

Szeptember második hetének időjárása a megszokottól is melegebb és szárazabb volt megyénkben. A talajok felső 20 cm rétege a művelés módtól függően kiszáradt vagy legalábbis a nedvesség tartalma jócskán elmaradt az optimálistól.



www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/csapadek/




www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/talaj/

A várható időjárás:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ECMWF valószínűségi előrejelzése megyénkre:

Az előrejelzés a következő dekádra szeptember 17.-ét követően lehűlést ezzel együtt jelentéktelen mennyiségű csapadékot majd ezt követően már szeptemberre jellemző középhőmérsékleti értékeket prognosztizál.



www.met.hu/idojaras/elorejelzes/valoszinusegi/

Fenológiaiák:

Kukorica: teljes érés (BBCH 89)

Napraforgó: barnaérés-növényszáradás (BBCH 89-97)

Alma: betakarítás előtti állapot (BBCH 87)

Polifág kártevők:

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) jelenleg az évelő pillangós állományokban nincs vagy csak a táblaszegélyekben haladja meg a gyenge (4 lakott járat/100m²) fertőzöttségi szintet.

Szántóföldi növények:

Kukorica:

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) még mindig előfordul a csapdákban, amit vélhetően a Délről bevándorló valamint a helyi populáció rajzás vége okoz. A kukoricamoly harmadik csonka nemzedékének a rajzása is elkezdődött. Elkezdődött a korai kukorica fajták betakarítása.

Napraforgó:

A napraforgó betakarítása javában tart, a állományok jelentős részében megfigyelhető valamilyen gombafertőzés ennek ellenére a termésátlagok biztatóak.


Repce:

A megyénkben elvetett repce területeken foltos, gyenge kelés illetve fejlettlen növények figyelhetők meg. A kelő növényeket a rovar ölőszeres csávázás ellenére a repcebolha (*Psylliodes chrysocephala*) károsítja. A repcéken több helyen már megjelent a repcedarázs (*Athalia rosae*) lávája is, ezért célszerű a . védekezésre felkészülni.

Alma.

Az elmúlt hét időjárása az alma érését is felgyorsította a korai fajták betakarítása megkezdődött.

Az Almalevél-sátorosmoly sem található már meg a csapdákbán, az őszi nemzedékének a rajzása befejeződött



Almalevél-sátorosmoly, Debrecen

Debrecen, 2019. szeptember 16.