




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye időszakos növényvédelmi helyzetképe

Az elmúlt hét eleje még hűvös, szeles volt majd a hét végére megérkezett az indián nyár. Az időjárás továbbra is kedvezően alakul a repce számára, ugyanakkor a még lábon álló napraforgó és a kukorica betakarítása csak a hét végén tudott elindulni.

Az elmúlt hét időjárása

Az elmúlt hét időjárását még mindig egy déli hullámzó frontrendszer alakította, mely a hét végére jelentősen meggyengült és egy északnyugati áramlási rendszer alakult ki. A hét végére már jelentősen csökkent a csapadék hajlam és felmelegedés kezdődött. A vasárnap délutántól erős északnyugati szél fújt, ami a talaj felszínét gyorsan felszárította.



Az országos csapadékmennyiség alakulása 09.27.-10.02. közötti időszakban

forrás: met.hu/idojaras/agrometeorologia/csapadek/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai: (39. hét)

Repce: 6- 8 leveles állapot (BBCH 16-18)

Napraforgó: barnaérés (BBCH 89)

Kukorica: száraz növény (BBCH 97)

Alma: érés (BBCH 83)

Polifág károsítók:

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) áttelepülése elkezdődött a lucerna és a repce táblákra. A megye északi részén tapasztaltunk erősebb fertőzést, de jelenleg ott sem éri el a kártétel mértéke a védekezési küszöbértéket. A mezei pocok populáció nagysága megyénkben átlagosnak mondható, egyelőre stagnál.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a repcében

Az augusztus végi vetések a kedvező időjárás miatt már 6-8 leveles, a szeptemberi vetések 4-6 leveles fejlettségűek.

Szórványosan a repcebolha (*Psyllodes chrysocephala*) kártétele megfigyelhető, ami rovarölő szeres csávázás és a repce gyors fejlődése miatt jelenleg nem jelentős.

A repcedarázs (*Athalia rosae*) rajzása a hűvös, csapadékos idő miatt vontatott. A már lerakott tojásokból szórványosan kikeltek az első hernyók. A kártétel mértéke az észlelési szintet épphogy eléri.

A kis káposztalégy (*Delia radicum*) harmadik nemzedéke még rajzik, továbbra is kevés példány van a csapadékos, szeles időjárás miatt gyenge, vontatott a rajzásdinamika.

A káposztamoly (*Plutella maculipennis*) negyedik nemzedékének a hernyója szórványosan károsítja a repcét, de jelentős kártételét nem tapasztaltuk.

A repceállományok intenzív növekedése miatt, a termelők elkezdték a regulátorok kijuttatását.

Szintén az elmúlt heti csapadék hatására folyamatos a T4 gyomok és búza árvakelés.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi árpában

A hét végén elkezdték a talajok előkészítését az őszi kalászosok alá. A hét végén elkezdődött az őszi árpa vetése.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az napraforgóban

A napraforgó betakarítása a végéhez közeledik, de a csapadékos időjárás miatt megállt. A még „lábon lévő” állományokban egyre nagyobb mértékű a szürkepenész fertőzés és a madárcár, a termés minősége folyamatosan romlik.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukorica betakarítás az elmúlt hét végén ismét folytatódott.

A csapadékos időjárás miatt helyenként jelentős a csövek (cső végek) Fuzárium és Aspergillus fertőzöttsége.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) rajzása befejeződött.

A gyapottok-bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) rajzása is befejeződött a kései betakarítású csemegekukoricában a hernyói még megtalálhatóak.

Kertészet:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Elkezdődött az alma szedés, az eddigi termésátlagok közepesnek mondhatóak, azonban az öntözött-intenzív ültetvények termésmennyisége volt a meghatározó.

Az almafa lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) terjedése befejeződött, szórványosan gyenge gyümölcsfertőzés tapasztalható. Megyénkben gyenge-közepes a hajtásfertőzöttség mértéke.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) fertőzésének kedvezett az elmúlt hét időjárása, ezért sokan elvégezték a szedés előtt a záró permetezést.

Debrecen, 2022. 10.03.