




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye időszakos növényvédelmi helyzetképe

Az elmúlt héten jellemzően napos szeles és csapadékmentes, kellemes koraőszi időjárás volt. A száraz időjárás kedvezett a talajmunkák végzéséhez és az őszi gabonák vetéséhez. A kukorica és a csapadékos idő miatt még kintmaradt napraforgó táblák betakarítása folytatódott illetve befejeződött.

Az elmúlt hét időjárása

Az elmúlt hét időjárását egy anticiklon alakította, melynek hatására csökkent a csapadékhajlam és a napi maximumhőmérséklet többször is elérte a 20-22 °C-ot. A talaj felső rétege kiszáradt, ami kedvezett a talajmunkákhoz és a vetéshez.



Az országos csapadékmennyiség alakulása 10.03.-10.09. közötti időszakban

forrás: met.hu/idojaras/agrometeorologia/csapadek/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiak: (40. hét)

Repce: 6- 9 leveles állapot (BBCH 16-19)

Kukorica: száraz növény (BBCH 97)

Őszi árpa: csírázás (BBCH 03-07)

Őszi búza: száraz mag-csírázás (BBCH 00-03)

Polifág károsítók:

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) áttelepülése elkezdődött a lucerna és a repce táblákra. A megye északi részén tapasztaltunk csak erősebb fertőzést, de jelenleg ott sem éri el a kártétel mértéke a védekezési küszöbértéket. A mezei pocok populáció nagysága megyénkben átlagosnak mondható, egyelőre stagnál.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a repcében

Az augusztus végi repce vetések a kedvező időjárás miatt már 8-9 leveles, a szeptemberi eleji vetések 6-8 leveles fejlettségűek.

A repcebolha (*Psylliodes chrysocephala*) kártétele már nem jelentős, a fejlett növényeken csak szórványosan fordul elő gyenge hámozgatás.

A repcedarázs (*Athalia rosae*) rajzása megyénkben befejeződött, a már lerakott tojásokból szórványosan kikeltek az első hernyók. Az L1-2 lárvák kártétele jelenleg még alig észlelhető.

A kis káposztalégy (*Delia radicum*) rajzása is befejeződött, a tömeges peterakás is a végéhez közeledik. A tömeges lárvakelés rövidesen elkezdődik, de vélhetően a fejlett állományokban nem lesz jelentős mértékű a kártétel.

A káposztamoly (*Plutella maculipennis*) negyedik nemzedékének a hernyója szórványosan károsítja a repcét, de jelentős kártételét nem tapasztaltuk.

A repceállományok intenzív növekedése miatt, a termelők elkezdték a regulátorok kijuttatását.

Szintén az elmúlt heti csapadék hatására folyamatos a T4 gyomok és búza árvakelése.



6-8 leveles fejlettségű repce, Hajdúszoboszló

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi árpában

Az elmúlt héten már a végéhez közeledett az árpa vetése. Az első vetések a kedvező időjárás miatt már sorolnak.

A kelő árpában tömeges a T4 életformájú gyomok kelése, de már elkezdődött a T1 és T2 gyomnövények kelése is.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi búzában

Megyénkben az őszi búza vetése is elkezdődött, javában folyik.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukorica betakarítás számára is kedvezően alakult az elmúlt hét időjárása, de a termésátlag fele a szokásosnak.

A csapadékos időjárás miatt helyenként jelentős a csövek (cső végek) Fuzárium és Aspergillus fertőzöttsége.

Kertészet:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

A kései fajták betakarítása még folyik, az eddigi termésátlagok közepesnek mondhatóak, azonban az öntözött-intenzív ültetvények termésmennyisége volt a meghatározó.