

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, engedélyező hatóság a **Mecsekerdő Zrt. (7600 Pécs, Rét u. 8.)** ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére

- **Tomigan 250 EC** (250 g/l fluroxipir) gyomirtó szer 48.361/2000. FVM számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdőszetben (*bükk, tölgy, cser erdőterületeken*), másodéves és idősebb folyamatos erdősítéseknel, továbbá vágásterületeken

2020. március 3-tól 2020. április 30-ig

és

2020. szeptember 15-től 2020. október 30-ig

- **Calaris Pro** (50 g/l mezo-trion, 326 g/l terbutilazin) gyomirtó szer 04.2/3528-1/2012. NÉBIH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdőszetben (*bükk, csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, feketedió és egyéb elegy fafajok*) makkvetése és csemete ültetése és csemetekerti makkvetés, továbbá másod- és harmadéves erdősítésekben
- **Lumax** (37,5 g/l mezo-trion+375 g/l S-metolaklór+125 g/l terbutilazin) gyomirtó szer 47179/2004. FVM számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdőszetben (*bükk, csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, feketedió és egyéb elegy fafajok*) makkvetése és csemete ültetése és csemetekerti makkvetés, továbbá másod- és harmadéves erdősítésekben

2020. február 17-től 2020. június 16-ig

- **Mezzo** (200 g/kg metszulfuron-metil) gyomirtó szer 04.2/4002-1/2017. NÉBIH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdőszeti területeken másodéves vagy idősebb erdősítésekben, továbbá vágásterületeken
- **Savvy** (200 g/kg metszulfuron-metil) gyomirtó szer 04.2/4010-1/2017. NÉBIH számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdőszeti területeken másodéves vagy idősebb erdősítésekben, továbbá vágásterületeken

2020. március 1-től 2020. május 30-ig

és

2020. augusztus 15-től 2020. szeptember 12-ig

engedélyezi.

A kérelmező termelői körének saját felelősségére:

- a **Tomigan 250EC** gyomirtó permetezőszert felhasználható erdészeti kultúrákban (*kizárólag bükk, tölgy, cser erdőterületeken*), másodéves és idősebb folyamatos erdősítéseknel, kora tavasszal a célkultúra rügyeinek pattanása előtt az első felmelegedések után és ősszel a célkultúra lombvesztése után szeder, vadrózsa, kökény és egyéb kétszikű lágyszárú és fásszárú gyomok ellen, 1,0 l/ha dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. *Tavaszi kezeléskor a célkultúra rügyeinek megduzzadását követően fitotoxicitási veszély miatt tilos a permetezés!* Vágásterületek kezelésére a teljes engedélyezett időszakban felhasználható szeder, vadrózsa, kökény és egyéb kétszikű lágyszárú és fásszárú gyomok ellen 1,0 l/ha dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. A gyomirtó hatás fokozása céljából tapadásfokozó és ammónium-nitrát műtrágya hozzáadása javasolt.
- a **Calaris Pro** gyomirtó permetezőszert felhasználható erdészeti kultúrákban bükk, csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, fekete dió és egyéb elegy fajokban magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni védekezésre tavaszi gyomkorlátozásra 1,8-2,3 l/ha dózisban, 20-200 l/ha permetlével földi kijuttatással. Makkvetésekben a kezeléseket közvetlenül a vetés után a makkok kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket elvégezni. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag hozzáadása javasolt.
- a **Lumax** gyomirtó permetezőszert felhasználható erdőalkotó területeken bükk, csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, fekete dió és egyéb elegy fajok kultúrákban magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni védekezésre tavaszi gyomkorlátozásra 4,0-5,0 l/ha dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. Makkvetésekben a kezeléseket közvetlenül vetés után a makkok kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket elvégezni. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag kombinálása javasolt.
- A **Mezzo** gyomirtó permetezőszert felhasználható erdészeti kultúrákban (2 éves és idősebb bükk, tölgy, cser, és elegyes lombos állományokban) magról kelő és évelő kétszikű gyomok elleni védekezésre kora tavasszal a célkultúra rügyeinek pattanása előtt az első felmelegedések után 40-100 g/ha dózisban. Az elegyes lombos fajokon végzett kezeléseket előtt érzékenységi vizsgálatokat kell végezni. A tankkeverékhez felületi feszültségcsökkentő illetve tapadást elősegítő adalékanyag használata nem javasolt. A háti gépes, motoros permetezéseket sorkezelések formájában vagy foltszerűen kell elvégezni a terület gyomosodásának mértéke szerint 20-300 liter/ha permetlé felhasználásával. Sorkezeléseknél a munkaszélesség 60-80 cm. Vágásterületek kezelésére a teljes engedélyezett időszakban felhasználható magról kelő és évelő kétszikű gyomok ellen 40-100 g/ha dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással.
- A **Savvy** gyomirtó permetezőszert felhasználható erdészeti kultúrákban (2 éves és idősebb bükk, tölgy, cser, és elegyes lombos állományokban) magról kelő és évelő kétszikű gyomok elleni védekezésre kora tavasszal a célkultúra rügyeinek pattanása előtt az első felmelegedések után 40-100 g/ha dózisban. Az elegyes lombos fajokon végzett kezeléseket előtt érzékenységi vizsgálatokat kell végezni. A tankkeverékhez felületi feszültségcsökkentő illetve tapadást elősegítő adalékanyag használata nem javasolt. A háti gépes, motoros permetezéseket sorkezelések formájában vagy foltszerűen kell elvégezni a terület gyomosodásának mértéke szerint 20-300 liter/ha permetlé felhasználásával. Sorkezeléseknél a munkaszélesség 60-80 cm. Vágásterületek kezelésére a teljes engedélyezett időszakban felhasználható magról kelő és évelő kétszikű gyomok ellen 40-100 g/ha dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással.

A készítmények hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok kultúránként legalább 2 területről).

*Erdészeti*ben előírászerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges. A kezelt területen az ehető növények, gyógynövények, gombák és vadon termő gyümölcsök

gyűjtése tilos!

A felhasználók kötelesek a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a területileg illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalt.

A készítmények felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

A kezelés kizárólag növényvédelmi szakmérnök felügyeletével történhet.

Jelen hatósági eljárás illetékmentes.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

Indokolás

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020. február 27.

Jordán László
igazgató