




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten nyárian meleg, szeles és száraz idő volt. A búza virágzása a késői fajták kivételével beindult, az árpa virágzása befejeződött. A kukorica és a napraforgó az adott táblán található víz tartaléktól függően fejlődött.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

Fenológiaiák (19. hét)

Őszi búza: levélhüvely felnyílása-kalászosítás

Őszi árpa: kalászosítás-virágzás kezdete

Őszi káposztarepce: szíromhullás-becőképződés

Kukorica: magduzzadás kezdete-1-4 leveles állapot

Napraforgó: magduzzadás kezdete-4 leveles állapot

Lucerna: első kaszálás

Alma: 5-10 mm-es gyümölcskezdemények

Őszibarack: 10 mm-es gyümölcskezdemények

Polifág károsítók

A lucerna az őszi kalászos, illetve a repce a táblákon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes. Erősebb pocok fertőzöttséget csak a táblaszegélyekben, illetve az árokpartokon tapasztaltunk.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

A kései vetésű napraforgó táblákon még mindig jelentős a mezei nyúl (*Lepus europaeus*) kártétele, ami ellen jelenleg hatékony vadriasztó szer nem áll rendelkezésre.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi búzában

A betegségek közül a lisztharmat (*Blumeria graminis*) tünetei láthatók a sűrűbb állományokban, de az elmúlt héthez képest nem erősödött a fertőzés: megállt az alsó leveleken.

A vetésfehérítő (*Lema melanopa*) fiatal lárvái már mindenfelé láthatók, de általában enyhe fertőzéssel lehet találkozni.

Megjelentek a gabonapoloskák, de egyelőre mérsékelt a fertőzés.

A levéltetű fertőzés erősödött: mostmár sok levélen láthatók kisebb kolóniák. A fertőzés még enyhének mondható, de a tendencia miatt érdemes figyelni rá. Az őszi árpa és a korábbi tritikálé fajták 80-90 %-ban kikalásztak: a jövő hét vége felé esedékes lehet a kalászvédelmük.



Poloska
fotó: Dr. Dávid István



Levéltetű
fotó: Dr. Dávid István

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A korábbi kukoricák már 3 (esetleg 4) levelesek, de sok az 1 leveles vagy kelő is.

A gyomosodás a korábbi talajmunkáktól függő. A magágykészítések óta számottevő csapadék nem volt, így egyöntetű, tömeges gyomkelés nem jellemző.

A nagymagvú, mélyebbről kelő gyomok kelnek inkább.

A kelő kukoricában drótféreg kártétel megjelent.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A fiatal növények föld feletti részén rovarkártevők egyelőre nem jellemzők: levéltetveket eddig nem láttam, barkókra utaló kártétel szórványos. A napraforgómoly első nemzedéke elkezdett rajzani.

A mezei nyúl (*Lepus europaeus*) kártétele többfelé jelentős.

A gyomosodásban nagy különbségek vannak, és táblán belül is foltos. Április eleje óta számottevő eső nem volt, így a magágykészítés során elpusztított gyomok helyén tömeges kelés egyelőre nincs. Betegségek tünetei nem láthatók.

Őszi káposztarepce

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi káposztarepcében

A virágok 70-80 %-a elnyílt, a korábban kötött becők intenzív növekedésben vannak.

Betegségek tünetei nem láthatók, egyelőre lisztharmat nyomát sem látom, még az alsó leveleken sem.

A repcebecő-ormányos (*Ceutorhynchus assimilis*) csapdákból nagyon gyenge fogás volt észlelhető. A virágzó állományban nem volt látható a virágokon, a fertőzés enyhének ítéltető. Becőszúnyog fertőzés is enyhének ítéltető. A már kötött becőkön egyelőre szórványosan látom a becőszúnyog kártételét.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszibarackban

Az őszibarack ültetvénybe a kelet gyümölcsmoly és a barackmoly rajzása még megfigyelhető.

Az állományokba a levéltetű fertőzés még nem tapasztalható.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése is jelentősen lassult, rövidesen meg fog állni.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) konídiumai tömegesen szóródnak, a fertőzés egyelőre alacsony, de ha kedvező lesz az időjárás a fertőzés mértéke nőni fog.

Az aknázó és sátoros molyok második nemzedékének a rajzása a hónap első felében elkezdődött, a lombosfa fehérmoly nemzedékek rajzása teljesen összefolyik. Az almamoly első nemzedékének

Debrecen, 2025.05.06.