



MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten tovább folytatódott a szeles és jellemzően száraz idő, előfordultak szórványosan záporok, de azokból érdembeli csapadék sehol sem hullott. Az árpában és a búzában a vetésfehérítő lárvák folyamatos kártétele volt megfigyelhető. A kukorica és a napraforgó szenvedett a vízhiánytól, ezért már több helyen elkezdték az öntözést.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (20. hét)

Őszi búza: virágzás kezdete-teljes virágzás

Őszi árpa: teljes virágzás

Őszi káposztarepce: becőképződés-50%-os becőméret

Kukorica: 1-5 leveles állapot

Napraforgó: 4-6 leveles állapot

Lucerna: második növedék 5 cm

Alma: 10-20 mm es gyümölcskezdemények

Őszibarack: 10 mm-es gyümölcskezdemények-gyümölcsnövekedés

Polifág károsítók

A lucerna az őszi kalászos, illetve a repce a táblákon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes. Erősebb pocok fertőzöttséget csak a táblaszegélyekben, illetve az árokpartokon tapasztaltunk.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

A kései vetésű napraforgó táblákon még mindig jelentős a mezei nyúl (*Lepus europaeus*) kártétele, ami ellen jelenleg hatékony vadriasztó szer nem áll rendelkezésre.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi búzában

A betegségek közül a lisztharmat (*Blumeria graminis*) tünetei láthatók a sűrűbb állományokban, de az elmúlt héthez képest nem erősödött a fertőzés: megállt az alsó leveleken.

Az őszi árpa és a korábbi tritikálé fajták virágoznak: esedékes lehet a kalászvédelmük.

Állati kártevők

A vetésfehérítő (*Lema melanopa*) lárvái már mindenfelé láthatók, szemmel láthatóan erősödik a kártétel: most közepes szintű.

Megjelentek a gabonapoloskák, de egyelőre mérsékelt a fertőzés.

A levéltetű fertőzés erősödött: mostmár sok levélen láthatók kisebb kolóniák, és a kalászon is megjelentek. A három kártevő csoportot figyelembe véve sokfelé indokoltá vált a védekezés.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukoricák 1-5 levél között vannak, vetésidőtől függően. A gyomosodás a korábbi talajmunkáktól függő. A magágykészítések óta számottevő csapadék nem volt, így egyöntetű, tömeges gyomkelés nem jellemző. A nagymagvú, mélyebbről kelő gyomok kelnek inkább.

Fiatalkori kártevők közül inkább a gerincesek kártétele jellemző, a barkók minimális kárát tapasztaltam.

A vetési bagolylepke elkezdett rajzani, de kicsi volt a fogás, és meg is torpant a rajzás.

A felkiáltójeles bagolylepkéből kicsivel többet fogtam, de még ez is mérsékelt fogás volt, egyelőre nem emelkedik nagy ütemben.

A gamma bagolylepke fogás május elején rohamosan emelkedett (napi 10 db/csapda felé), de gyorsan vissza is esett (feltehetőleg a lehülés miatt). Gyapottok bagolylepkét még nem fogott a feromoncsapda..

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A fiatal növények föld feletti részén rovarkártevők egyelőre nem jellemzők: levéltetveket eddig nem láttam, barkókra utaló kártétel szórványos.

Helyenként drótféreg miatt hervadó töveket lehet látni. A napraforgómoly első nemzedékéből a fogás rohamosan nőtt május elején, de a héten megállt (feltehetőleg a lehülés miatt).

A mezei nyúl kártétele többfelé jelentős.

A gyomosodásban nagy különbségek vannak, és táblán belül is foltos. Április eleje óta számottevő eső nem volt, így a magágykészítés során elpusztított gyomok helyén tömeges kelés egyelőre nincs (a nagymagvú gyomok keltek nagyobb számban).

Betegségek tünetei nem láthatók..

Őszi káposztarepce

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi káposztarepcében

A repce egyelőre jó egészségi állapotban van. Szárbetegségek (fóma (*Phoma lingam*),, fehérpenész (*Sclerotinia sclerotiorum*)) tüneteit egyelőre nem látom, a leveleken és a becőkön sincsenek betegségek tünetei. (hozzá kell tenni, hogy volt gombaölő szerves kezelés virágzásban).

A becőkön a kártevő nyomás egyelőre nem tűnik erősnek, a becőszúnyog lárvák okozta jellegzetes tünetek sem gyakoriak.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

A lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzés továbbra is igen erőteljesen jelentkezik (25-30%).

Levélnázók kártételét nem észleltem.


Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 3% körüli.

Takácsatka, vértetű jelenléte nem detektálható.


A varasodás (*Venturia inaequalis*) kezdeti levéltünetei megfigyelhetők, egyelőre 2-3 %-os fertőzöttségi szinten.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszibarackban


A Tafrinás levélfoltosság (*Taphrina deformans*) igen intenzíven károsított az őszibarackban. A nem permetezett fák esetében 80% fölötti fertőzöttség megfigyelhető.



Keleti gyümölcsmoly rajzása, Debrecen



Barackmoly rajzása, Debrecen



Almamoly rajzása, Debrecen

Debrecen, 2025.05.12.