




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten a szórványosan kialakuló helyi záporokból, zivatarokból több-kevesebb eső esett, mely helyileg és időszakosan csökkentette az aszályt.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levél nedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



HungaroMet: 2025. június 3. 16:52 (14:52 UTC) fmhSul

Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiak (22. hét)

Őszi búza: virágzás vége-szemképződés (BBCH 69-71)

Őszi árpa: szemképződés-tejesérés (BBCH 71-75)

Őszi káposztarepce: 80%-os becőméret-a becők többsége elérte a végleges nagyságot (BBCH 78-79)

Kukorica: 5-9 leveles állapot (BBCH 15-19)

Napraforgó: 6-12 leveles állapot (BBCH 16-112)

Lucerna: második növedék 20 cm

Alma: 2-4 cm gyümölcsméret (BBCH 73-75)

Őszibarack: gyümölcsnövekedés (74-75)

Polifág károsítók

A lucerna az őszi kalászos, illetve a repce a táblákon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes. Erősebb pocok fertőzöttséget csak a táblaszegélyekben, illetve az árokpartokon tapasztaltunk.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi búzában

A búzában a kötött szemek növekedésnek indultak.


Kalászvédelmi kezelésen átesett őszi búzákon levélbetegségek nem látszanak, és a kalászosokon sem látható egyelőre semmilyen tünet.

Május közepére számottevő vetésfehérítő (*Lema melanopa*) és levéltetű fertőzés alakult ki, a poloska fertőzés pedig mérsékelt volt. Ahol a kalászvédellel együtt megfelelő rovarölő szert is használtak, ott minimálisra szorult vissza a fertőzöttség mindegyikből.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukoricatáblákon tömeges a gyomok jelenléte, a gyomirtást folyamatosan végzik a termelők.

A kukoricatáblán kihelyezett feromon csapdában meggyeszerre megjelent a vetési bagolylepke.



A vetési bagolylepke rajzása, Darvas

A május 3. dekádjában hullott csapadékok elindíthatnak egy második gyomkelést (vagy ahol eddig nem nagyon keltek a gyomok, ott az elsőt). A kisebb vagy ritkább állományokban ez még veszélyes lehet.

A kukoricamoly rajzása elindult a hét közepén, és nem csak hébe-hóba 1-1 db: naponta fog a fénycsapda 2-10 darabot.

Gyapottok bagolylepkéből a héten megvolt az első fogás a feromoncsapdában, de nem tömeges.

Vetési bagolylepke a héten egyáltalán nem repült a csapdába, felkiáltójelesből 2 db/nap volt az átlag, gammából pedig 1 db/nap.

A kukorica alapvetően jó állapotban van, a hidegben előjött lilulás is kezd elmúlni

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

Az eső és a melegedés hatására elkezdett nőni a napraforgó.

A májusi kártevők közül egyértelműen a mezei nyúl emelkedik ki: a tartós hidegben nagyon lelassult a napraforgó növekedése, és nagyon hosszú időre elnyúlt a kártétel. Sok helyen jelentős tőszámkiesést eredményezett.

A drótférgek kisebb-nagyobb foltokban szintén okoztak tőpusztulásokat. A két kártevő hatására foltokban alaposan megritkult állomány lehetőséget ad a késői gyomosodásra.

A levéltetvek továbbra is szórványosan fordulnak elő a napraforgón. A napraforgómoly a múlt hét második felében ismét elkezdett rajzani, és ez ezen a héten is folytatódott.

Betegségek tünetei nem látszódnak, peronoszpórás tövekkel sem találkoztam eddig.

Őszi káposztarepce

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi káposztarepcében

A repce alapvetően egészséges: szár- vagy levélbetegség egyelőre elvértve látható, a becőrontó szórványosan fordul elő.

Kártevők károkozása is minimális, a becőszűnyog tipikus tünetei is csak szórványosan jelentkeznek.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

A lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzés továbbra is igen erőteljesen jelentkezik (25-30%).

Varasodás kezdeti levéltünetei megfigyelhetők, egyelőre 3-5 %-os fertőzöttségi szinten.

Levélnézók kártételét nem észleltem.

Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 5% körüli.

Takácsatka, vértetű jelenléte nyomokban detektálható.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az Őszibarackban

A Tafrinás levélfoltosság igen intenzíven károsított az őszibarackban. A nem permetezett fák esetében 70% fölötti fertőzöttség megfigyelhető. Enyhe zöld őszibarack levéltetű fertőzöttség: 3 %.

Egyéb információk:

Szőlő- Peronoszpóra indul 5% körüli tünetek. Egyes helyeken igen jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlőmoly fogás emelkedő létszámok 05.28-23 db, 05.31-34 db.

Szilvamoly továbbra is nagyszámú fogások: 05.28.-48 db, 05.31.-56 db.

Poloskaszagú szilvadarázs eltűnt. Fogások: 05.28.-0 db, 05.31.-0 db.

Csereznyleg viszont megindult: 05.28.-18 db, 05.31.-21 db.

Fekete cserezsnye levéltetű fokozódó megjelenése: 5-10 %.

Almában takácsatka levélkártétel látható, elég alacsony szinten (kb. 3-5%).

Debrecen, 2025.06.03.