




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten csak szórványosan alakultak ki helyi záporok, zivatarok. A hét első napjaiban viszont már heves zivatarok is képződtek, Debrecen környékén a jégeső okozott kisebb károkat. Kisebb mennyiségű csapadék csak szórványosan hullott, megyénk jelentős részén még mindig aszály van.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (23. hét)

Őszi búza: szemképződés-tejesérés (BBCH 71-75)

Őszi árpa: viaszérés (BBCH 75)

Őszi káposztarepce: 80%-os becőméret-a becők többsége elérte a végleges nagyságot (BBCH 78-79)

Kukorica: 7-9 leveles állapot (BBCH 17-19)

Napraforgó: 9-12 leveles állapot (BBCH 19-112)

Lucerna: második növedék 25 cm

Alma: 4 cm gyümölcsméret (BBCH 75)

Őszibarack: gyümölcsnövekedés (75)

Polifág károsítók

A lucerna az őszi kalászos, illetve a repce a táblákon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes. Erősebb pocok fertőzöttséget csak a táblaszegélyekben, illetve az árokpartokon tapasztaltunk.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi búzában

A búza, árpa általános kórtani helyzete jó, nagyobb problémák nélkül ment le a tenyészidőszak.

A sokáig szárazságtól sínylődő állományokra virágzásban több kisebb csapadék hullott, ami növelhette a fuzárium (*Fusarium spp.*) fertőzés esélyét, bár tünetei egyelőre nem jelentkeznek.

A virágzáskor eredményesen elvégzett kezelések után az levéltetvek már nem tudtak újra felszaporodni.

Térségünkben permetezéssel növényvédelmet már nem terveznek, aratásra készülnek.

Állati kártevők

A táblákon szórványosan megjelentek a szipolyok, de jelentős kártételt sehol sem tapasztaltunk.



Szipoly (Fotó: Gálóczi-Tömösvári Róbert, 2025.)

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A májusi hideg után látványosan megindult a kukoricák növekedése.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) fogás az előző héthez képest emelkedett: a fénycsapdában a napi fogás 11 és 33 között ingadozott.

Más kártevők egyelőre nem veszélyeztetik az állományt.

A vetési és gyapottok bagolylepkéből szórványos a fogás. Felkiáltójeles bagolylepkéből mérsékelt, gammából közepes a fogás a héten.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A levéltetvek a minden táblán jelen vannak, de most már jellemzően a csillagbimbó környékén a sárga szilva levéltetű (*Brachycaudus helichrysi*) található meg.

Az alsó leveleken szinte minden táblán megtalálható az alternaria (*Alternaria helianthi* / *A. helianthificiens*) fertőzés kezdeti tünete.

A napraforgók fejlettsége nagyon eltérő: 2-4 levéltől a korai csillagbimbóig fordulnak elő.

Májusban inkább öregedtek a napraforgók, mintsem nőttek volna, de a héten már intenzív volt a növekedés.

Betegségek tünetei nem láthatók, peronoszpórás töveket sem találtam eddig.

A gerinctelen kártevőkkel nagy gond jelenleg nincs: kabócák előfordulnak a napraforgón (közepes fertőzöttség), itt-ott mezei poloskákat is látok.

A levéltetveknek egyelőre csak a szárnyas alakjaival találkoztam, még kisebb kolóniát sem észleltem eddig a napraforgón.

A későbbi vetéseken szorgalmasan károsít a mezei nyúl, a fejlettebb állományokban a szerepét átvette a dóm.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése ismét lendületet vett, dinamikus terjed, ezért továbbra is indokolt ellene a védekezés.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) konídiumai tömegesen szóródnak, a fertőzés egyelőre közepes, de ha továbbra is kedvező lesz az időjárás a gyümölcs fertőzés mértéke dinamikus nőni fog.

Az aknázó és sátoros molyok és a lombosfa fehérmoly második nemzedéke javában rajzik, folyamatosan jelen van a csapdákbán. Az almamoly rajzása elérte a csúcst.

Debrecen, 2025.06.10.