




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten nem esett csapadék, ezért aszályhelyzet állt elő.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiák (25. hét)

Őszi búza: viaszérés kezdete-viaszérés (BBCH 81-85)

Őszi árpa: viaszérés-sárgaérés (BBCH 85-87)

Őszi káposztarepce: becősárgulás-a becők 50%-a érett (BBCH 80-85)

Kukorica: 12 leveles állapot-szármegnyúlás (BBCH 112-31)

Napraforgó: csillagállapot-virágzat kiemelkedése (BBCH 51-55)

Lucerna: második növedék 30 cm

Alma: 50%-os gyümölcsméret (BBCH 75)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) jelenléte egyre látványosabb: gyepeken, lucernában már fényes nappal lehet látni, ahogy szaladgálnak. Az érő gabonában is megjelent a kártételük: többnyire még néhány elragott tövű szál jelzi a jelenlétüket, de gyepek mellett már kisebb, tarra rágott foltot is találtam.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi búzában

A búza, árpa általános kórtani helyzete jó, nagyobb problémák nélkül ment le a tenyészidőszak.

A sokáig szárazságtól sínylődő állományokra virágzásban több kisebb csapadék hullott, ami növelhette a fuzárium fertőzés esélyét (ennek tüneteit egyelőre nem látszik).

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi árpában

Az őszi árpák többsége a viaszérés végén van, a kórokozók - kártevők kártételével már nem kell számolnunk.



Levéltetű búzakalászon Fotó: Dávid István

Állati kártevők

A táblákon szórványosan megjelentek a szipolyok, de jelentős kártételt sehol sem tapasztaltunk.

A virágzáskor eredményesen elvégzett kezelések után az levéltetvek már nem tudtak újra felszaporodni.

A poloska fertőzés mérsékelte.

.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukoricamoly rajzása a héten már jelentősen visszaesett, így kijelenthető, hogy a rajzás csúcsa június 1. dekádjára esett.

A kukoricabogarat még nem fogja a feromoncsapda.

A vetési bagolylepkét a május 2. felére - június első napjaira eső gyenge rajzás óta nem fog a feromoncsapda, és a gyapottok bagolylepkéből is szórványos a fogás.

A gamma bagolylepke június 5 után csökkenő számban került a csapdába, mostanra gyakorlatilag lerajzott ez a nemzedék.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

Betegségek tünetei egyelőre nem láthatók a napraforgón.

A levéltetű fertőzés mérsékelte: általában néhány szárnyas alak fordul elő, kolóniákat egy-egy táblaszéli tövön lehet néha látni.

A mezei poloska fertőzés közepes mértékű.

Őszi káposztarepce

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi káposztarepcében

A lisztharmat (*Erysiphe cruciferarum*), minden állományban megtalálható a fertőzés mértéke igen szélsőséges, de a terjedésével már nem kell számolnunk.

A repce érése felgyorsult, a becőragasztó használata a legtöbb táblán indokolt.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése ismét lendületet vett, dinamikus terjed, ezért továbbra is indokolt ellene a védekezés.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) konídiumai tömegesen szóródnak, a fertőzés egyelőre közepes, de ha továbbra is kedvező lesz az időjárás a gyümölcs fertőzés mértéke dinamikus nőni fog.

Az almamoly első nemzedékének a rajzása befejeződött, a tömeges lárvakelés időszakának a végén vagyunk.

Egyéb információk:

Szőlő Peronoszpóra indul 5% körüli tünetek. Egyes helyeken igen jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlőmoly fogás létszámok 06.14-30 db, 06.17-14 db.

Szilvamoly továbbra is nagyszámú fogások: 06.14.-88 db, 06.17.-63 db.

Poloskaszagú szilvadarázs eltűnt. Fogások: 0 db minden időpontban.

Cseresznyelégyszár megindult: 06.14.-30 db, 06.17.-45 db.

Fekete cseresznye levéltetű fokozódó megjelenése: 5-10 %.

Almában takácsatka levélkártétel látható, elég alacsony szinten (kb. 3-5%).

Dióburok fúrólégyszár 06.14- 2 db, 06.17-3 db.

Debrecen, 2025.06.17.