



MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Sajnos a csapadékhány teljes aszályt okoz térségünkben. Nagyon várjuk a frissítő csapadékokat, de az előrejelzések szerint nem várható.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiák (25. hét)

Őszi búza: viaszérés kezdete-viaszérés (BBCH 81-85)

Őszi árpa: sárgaérés-teljesérés (BBCH 87-89)

Őszi káposztarepce: a becők 50-80%-a érett (BBCH 85-88)

Kukorica: 12 leveles állapot-szármegnyúlás (BBCH 112-31)

Napraforgó: virágzat kiemelkedése (BBCH 55)

Lucerna: második növedék 40 cm

Alma: 50%-os gyümölcsméret (BBCH 75)

Polifág károsítók

A lucerna az őszi kalászos, illetve a repce a táblákon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes. Erősebb pocok fertőzöttséget csak a táblaszegélyekben, illetve az árokpartokon tapasztaltunk.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi búzában

A búza lombja már a hosszabb tenyészidejű és jobb állapotú állományokban is leszáradt.

A kalászon kórokozók tünetei nem látszanak.

Állati kártevők

A táblákon szórványosan megjelentek a szipolyok, de jelentős kártételt sehol sem tapasztaltunk.

A szemek még puhák, de már nem sokáig kell várni a betakarítással. Sok esetben megszorultak.

Összeaszalódott, töppedt búzaszemeket találok a kalászban

A kártevők közül jelenleg a mezei pocok a legjelentősebb: szinte minden táblán károsít, bár egyelőre még foltok csak elvétve alakultak ki, inkább "szálalगत".

Poloskát, vagy rá utaló kárképet alig látni. A korábbi búzák várhatóan 3-4 napon belül betakaríthatóvá válnak.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A héten már minimálissá vált a kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) fogás, és nem is volt rendszeres.

A kukoricabogarat (*Diabrotica virgifera*) még nem fogja a csapda (bár ez a csapda annyira nem mérvadó, mert alig van kukorica a környéken, és nekünk sincs minden évben).

A különféle bagolylepkéket (vetési, felkiáltójeles, gamma, gyapottok) a héten egyáltalán nem fogta a feromoncsapda, bár az is igaz, hogy a gamma bagolylepkét a fénycsapda pedig fogja.

A kukoricán egyelőre kártevő vagy kórokozó miatti probléma egyelőre nem látszik, a vízhiány tünetei azonban már többfelé látszanak.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A betegségek közül a fehérpenészes szártőrothadás (*Sclerotinia sclerotiorum*) tünetei láthatók itt-ott.

A levéltetű fertőzés továbbra is gyenge, kolóniákkal nem találkozok.

A mezei poloska fertőzés közepes.

Őszi káposztarepce

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi káposztarepcében

A repce érése felgyorsult, a becőragasztó használata a legtöbb táblán indokolt.

Kertészeti növények:


A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

A lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzés továbbra is igen erőteljesen jelentkezik (30-35%).

Varasodás (*Venturia inaequalis*) kezdeti levéltünetei megfigyelhetők, egyelőre 3-5 %-os fertőzöttségi szinten.

Levélnázók kártételét nem észleltem. Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 5% körüli.

Takácsatka, vértetű jelenléte nyomokban detektálható



Almamoly rajzás
Forrás: Dr. Radócz László

Egyéb információk:

Szőlő- Peronoszpóra indul 5% körüli tünetek. Egyes helyeken igen jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlőmoly fogás létszámok 06,20-10 db, 06,24-6 db.

Szilvamoly továbbra is nagyszámú fogások: 06.20.-75 db, 06.24.-61 db.

Poloskaszagú szilvadarázs eltűnt. Fogások: 0 db minden időpontban.

Cseresznyélegy viszont megindult: 06.20.-25 db, 06.24.-20 db.

Fekete cseresznye levéltetű fokozódó megjelenése: 5-10 %.

Hamvas szilva levéltetű tömeges megjelenése 30% körüli fertőzöttség.

Almában takácsatka levélkártétel látható, elég alacsony szinten (kb. 3-5%).

Dióburok fúrólégy 06.20- 0 db, 06.24-2 db.

Debrecen, 2025.06.23.