




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten folytatódott a kánikula. Pénteken volt egy jelentősebb csapadék.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiák (27. hét)

Őszi búza: teljesérés (BBCH 89)

Őszi árpa: teljesérés (BBCH 89)

Őszi káposztarepce: teljes érés (BBCH 89)

Kukorica: teljes virágzás (BBCH 65)

Napraforgó: teljes virágzás (BBCH 65)

Lucerna: második növedék 50 cm

Alma: 50%-os gyümölcsméret (BBCH 75)

Polifág károsítók

A lucerna az őszi kalászos, illetve a repce a táblákon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes. Elkezdődött a mezei pocok betelepődése a kapás kultúrákba.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) hernyói már megjelentek az összegöngyölt felső levelek között. Tömeges lárvakelés a héten várható az előrejelzések szerint.

A kukoricabogarat (*Diabrotica virgifera*) még nem fogott a csapda (bár ez a csapda annyira nem mérvadó, mert alig van kukorica a környéken, és nekünk sincs minden évben)

A különféle bagolylepkéket (felkiáltójeles, gamma, gyapottok) a héten egyáltalán nem fogott a feromoncsapda, bár az is igaz, hogy a gamma bagolylepkét a fénycsapda pedig fogja.

Vetési bagolylepkéből szórványos a fogás.



kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) Fotó: Dr. Dávid István

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A korábbi napraforgók elkezdtek virágozni.

A rovarkártevők jelenleg nem okoznak problémát:

Levéltetű kolóniák nem alakultak ki, a napraforgó gyakorlatilag tetű mentes.

A poloska és kabóca fertőzés sem erős.

A virágzaton sem találtam kártevőt.

A napraforgó moly kb. 1 hónapja folyamatosan rajzik, kisebb-nagyobb intenzitással.

A betegségek közül a fehérpenészes szártőrothadás (*Sclerotinia sclerotiorum*) tüneteit lehet látni, a fertőzés mérsékelte.



fehérpenészes szártörőthadás (*Sclerotinia sclerotiorum*) Fotó: Dr. Dávid István

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában


Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzés továbbra is igen erőteljesen jelentkezik (30-35%).

Levélnázók kártételét nem észleltem.

Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 5% körüli.

Takácsatka (*Tetranychus urticae*), vértetű jelenléte nyomokban detektálható.

Varasodás (*Venturia inaequalis*) kezdeti levéltünetei megfigyelhetők, egyelőre 3-5 %-os fertőzöttségi szinten.



Almamoly (*Cydia pomonella*) fogási adatok. Forrás: Dr. Radócz László (Debrecen)

Egyéb információk:

Szőlő- Peronoszpóra indul 5% körüli tünetek. Egyes helyeken igen jelentős a nemezes guubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlőmoly fogás létszámok 06,27-4 db, 06,30-2 db.

Szilvamoly továbbra is nagyszámú fogások: 06.27.-66 db, 06.30.-71 db.

Poloskaszagú szilvadarázs eltűnt. Fogások: 0 db minden időpontban.

Cseresznyélegy viszont megindult: 06.27.-21 db, 06.30.-27 db.

Fekete cseresznye levéltetű megjelenése: 5 %.

Almában takácsatka levélkártétel látható, egyelőre alacsony szinten (kb. 5%).

A gyapottok bagolylepke megindult. A fogási adatokról a polifág károsítók úrlapon írtam.

További fogás dióburok fúrólégy 06.27- 3 db, 06.30-2 db.

Debrecen, 2025.07.01.