




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Folytatódott a nyárhoz képest ritka, hűvös, borult időjárás. Kedden 0,4 mm, szerdán 3,4 mm, csütörtökön 0,2 mm, pénteken 3,2 mm esett. Sok helyen azonban már elkésett az eső, jelentős aszályt szenvedtek a kapások.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (29. hét)

Kukorica: tejesérés (BBCH 73-75)

Napraforgó: virágzás vége-magképződés (BBCH 69-71)

Alma: 50-70%-os gyümölcsméret (BBCH 75-77)

Polifág károsítók

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.


A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények


A amerikai kukoricabogár (*Diabrotica virgifera*) fogás jelentősen nőtt a héten a feromoncsapdában.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) 2. nemzedéke is elkezdett rajzani, bár a héten még viszonylag kis egyedszám volt a fénycsapdában (1-3 db/nap).

Gyapottok bagolylepkét (*Helicoverpa armigera*) nem fogja a feromoncsapda.



A kukoricabogár rajzása, Darvas



A Gyapottok bagolylepké rajzása, Debrecen-Józsa

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A korábbi vetésű napraforgók elvirágoztak, a későbbiek még virágoznak.

Szárbetegségek tünetei egyelőre nem láthatók, kivéve a fehérpenészes szártőrothadás (*Sclerotinia sclerotiorum*) miatt elhervadt töveket.

Az elmúlt 7-10 napban voltak kisebb esők, amitől kicsit párásabb lett a levegő, még harmat is volt reggelente. Ez esetleg esélyt teremtett néhány kórokozónak a fertőzésre. A tányérokön kártevőket nem láttam.

A napraforgómoly második nemzedéke is lerajzott.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában


A lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzés jelentős (20%).

Levélnaknázók kártételét nem észleltem.

Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 3% körüli.

Takácsatka (*Tetranychus urticae*), vértetű jelenléte emelkedő tendenciát mutat.

Varasodás (*Venturia inaequalis* kezdeti levéltünetei megfigyelhetők, egyelőre 5 %-os fertőzöttségi szinten.



Az almamoly (*Cydia pomonella*) rajzás – Debrecen-Józsa.

Hamvas szilva levéltetű jelenléte 10% körüli fertőzöttség.

Szilvamoly továbbra is jelen van fogások 07.12.-65, 07.16.-73, 07.19-88 db. . Szilvadarázs-0 db.

Amerikai fehér medvelepke útmenti bokron 1 helyszínen (Bodaszőlő bekötő út és 35. főút között).

Sáskák megjelenését nem tapasztaltam.

Egyéb információk:

Szőlő- Peronoszpóra indul 6-7% körüli tünetek. Egyes helyeken igen jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlőmoly fogás létszámok 07.12-3 db, 07.16-4 db, 07.19.-6 db.

Szilvamoly továbbra is nagyszámú fogások. Úgy tűnik, hogy a 2. és 3. nemzedék összefolyik. (A polifág űrlapon feltüntettem)

Poloskaszagú szilvadarázs eltűnt. Fogások: 0 db minden időpontban.

Cseresznyélegy még van: 07.12.-2 db, 07.16.-3 db, 07.19.-1 db

Fekete cseresznye levéltetű megjelenése: 5 %.

Almában takácsatka levélkártétel látható, egyelőre alacsony szinten (kb. 5%).

A gyapottok bagolylepke megindult. A fogási adatokról a kukorica úrlapon írtam.

További fogás dióburok fúrólégy 07.12- 2 db, 07.16-5 db, 07.19.-6 db.

Debrecen, 2025.07.21