




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

A hétfői csapadékos időszak után meleg, napsütéses időszak következett. A csapadék felszikkadása után folytatni lehet a megelőző, növényvédelmi kezeléseket.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiak (31. hét)

Kukorica: viaszérés-sárgaérés (BBCH 85-87)

Napraforgó: citromérés (BBCH 83)

Alma:érés (BBCH 83-85)

Polifág károsítók

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukoricák továbbra is a vízhiánytól szenvednek leginkább, a kisebb csapadékok ezt nem nagyon tudták orvosolni.

A kukoricamoly fogás az időjárás miatt eléggé ingadozó volt a héten: volt olyan nap is, amikor 0 db repült a fénycsapdába és olyan is, amikor 40 db.

A kukoricabogár kisebb számban ugyan, de továbbra is repül a feromoncsapdába, és a gyapottok bagólylepke is repül a feromoncsapdába.

A csővégeken, a csuhéjlevelek alatt gyakran találom kukoricabogár imágókat, és kártételük is látható. Helyenként hernyókártétel is előfordul. A rágások helyén kisebb penészfoltok már megjelentek a csővégeken.

A golyvásüszög viszont egyre több helyen bukkan fel, ill a károsított csővégeken gombásodás is megfigyelhető (Szürke és fehér penészgyep).



A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

Roszsab vízgazdálkodású talajfoltoktól eltekintve a napraforgószár felső felén a levelek zöldek.

A szárbetegségek továbbra sem okoznak számottevő problémát, csak a fehérpenészes szártőrothadás miatt korábban elpusztult tövek látszanak ki az állományokból.

A tányérokön rovarkártevők okozta kártétel nem jellemző, a kaszatokat fogyasztó madarak kára azonban minden táblán tetten érhető: egyrészt a tányérből kivert szemek, másrészt a karmukkal, csőrükkel okozott sebzések, amik következtében a szürkepenészes tányérrothadás meg is jelent. A tányérrothadás jelenleg az állomány 1-3%-át érinti.



Kertészeti növények:**A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában**

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése a száraz kánikulai idő miatt megállt.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) terjedése szintén a kánikulai időjárás miatt is megállt.

Az almamoly (*Cydia pomonella*) a második nemzedéke még mindig rajzik, a védekezések megkezdése az érettségtől függően még mindig indokolt.

A takácsatkák (*Tetranychus urticae*) tömegesen jelen vannak a fák alsó levelein, a kedvező időjárás miatt dinamikus szaporodnak, jelentős kártétel tapasztalható.

Debrecen, 2025.08.04.