




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

A csapadékosabb időszak után szárazabb időszak következett a múlt héten. A napi maximumhőmérséklet meghaladja a 30°C-t ami a légköri aszály okoz.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiák (32. hét)

Kukorica: sárgaérés-teljesérés (BBCH 87-89)

Napraforgó: citromérés-barnaérés (BBCH 87-89)

Alma: érés (BBCH 85-87)

Polifág károsítók

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában


A kukoricák továbbra is a vízhiánytól szenvednek leginkább, a kisebb csapadékok ezt nem nagyon tudták orvosolni.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) fogás a fénycsapdában a héten már egyértelműen csökkenő tendenciát mutatott.

A kukoricabogár kisebb számban ugyan, de továbbra is repül a feromoncsapdába.

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) fogás mérsékelt feromoncsapdában. Másodvetés csemege kukoricában a levelek közt a címer tövében lapul, a csapdában 46 db lepke volt, szóval nagyon nagy létszámban van jelen.

A csővégeken, a csuhéjlevelek alatt gyakran találók kukoricabogár imágókat, és kártételük is látható. Helyenként hernyókártétel is előfordul. A rágások helyén kisebb penészfoltok már megjelentek a csővégeken. A vetési bagolylepke fogás szórványos, a gamma bagolylepke rajzása közepes erősségű.



Gyapottok bagolylepke előfordulás - Darvas

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgó nagy része a citromérés valamilyen fázisában van.

Az alapvetően száraz nyár következtében a szárbetegségek tünetei nem jellemzők az állományokon.

Gyanúsán hervadó, hamuszürke korhadásra utaló állományok egyelőre nem nagyon jellemzők.

A tányérok túlnyomó többsége egészséges (hernyó kártétel, betegségek nem láthatók rajtuk), a botritiszes tányérrothadás 5 % alatti.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a gyümölcsösben

Hamvas szilva levéltetű jelenléte 3% körüli fertőzöttség.

Szilvamoly továbbra is jelen van fogások 08.03.-36, 08.06.-31, 08.10.-25 db.

Szilvadarázs-0 db. Amerikai fehér medvelepke útmenti bokron 1 helyszínen (Bodaszőlő bekötő út és 35. főút között).

Sáskák megjelenését nem tapasztaltam.

Szőlő- Peronoszpóra indul 6-7% körüli tünetek. Egyes helyeken jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlómoly fogás létszámok 08.03-8 db, 08.06-5 db, 08.10.-6 db.

Szilvamoly továbbra is viszonylag nagyszámú fogások. Úgy tűnik, hogy a 2. és 3. nemzedék összefolyik. (A polifág úrlapon feltüntettem)


Poloskaszagú szilvadarázs gyakorlatilag eltűnt. Fogások: 0 db minden időpontban.

Cseresznyelégység esetében: 0 mindhárom augusztusi időpontban


Almában takácsatka levélkártétel látható, egyelőre alacsony szinten (kb. 5-8%).


További fogás dióburok fűrólégy 08.03- 10 db, 08.06-25 db, 08.10.-33 db

Grapholita molesta



Anarsia lineatella





Debrecen, 2025.08.11