




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe


Az elmúlt héten csak szórványosan fordult elő vihar 17.én, némi esővel. Elszórtan esett a csapadék, gyakran településen belül is változatosan.

A határ változatos képet mutat. Főleg a kései vetésekre volt kedvező a június-júliusi csapadék. A korai vetéseken ez már nem segített. A megye bizonyos részein pedig alig esett csapadék. A légköri aszály a termékenyülést is rontotta sok helyen. A határ így nagyon változatos képet mutat.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levegőnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (34. hét)

Kukorica: sárgaérés-teljesérés (BBCH 87-89)

Napraforgó: citromérés-barnaérés (BBCH 87-89)

Alma:érés (BBCH 89)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jelenleg alacsony. A fő károsítási forrás a lucerna, és egyéb szálas pillangós vetések.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukoricák továbbra is a vízhiánytól szenvednek leginkább, a kisebb csapadékok ezt nem nagyon tudták orvosolni.


A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) fogás a fénycsapdában a héten már szórványossá vált: a 2. nemzedék gyakorlatilag lerajzott.

A kukoricabogár kisebb számban ugyan, de továbbra is repül a feromoncsapdába.

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) fogás mérsékelt feromoncsapdában.

A kukoricabogár- és hernyórágások helyén kisebb penészfoltok vannak a csővégeken, a száraz időben nem terjednek gyorsan.

A vetési bagolylepke fogás szórványos, a gamma bagolylepke rajzása is visszaesett.



A gyapottok-bagolylepke rajzásának alakulása Darvason

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgó nagy része a citromérés valamilyen fázisában van. A korábbi vetések alkalmassá válhatnak a betakarítás előtti gyomirtásra.

Az alapvetően száraz nyár következtében a szárbetegségek tünetei nem jellemzőek. Diaporthe, alternária, rozsda jeleit lehet itt-ott látni a levélen. Gyanúsán hervadó, hamuszürke korhadásra utaló állományok nem jellemzők.

A tányérok túlnyomó többsége egészséges (hernyó kártétel, betegségek nem láthatók rajtuk), a botritiszes tányérrothadás 5 % alatti.

Jelenős a madarak által kivert szemek nagysága.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Az almában még nem kezdődött el a betakarítás, a felkészülés már elkezdődött.

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése a száraz kánikulai idő miatt megállt.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) terjedése szintén a kánikulai időjárás miatt is megállt.

Az almamoly (*Cydia pomonella*) a második nemzedékének befejeződött a rajzása, folyamatos a tojásrakás.

Az almailonca és az aknázómolymok rajzása is befejeződött, az idén már nem kell a kártételükkel számolni.

Debrecen, 2025.08.18