




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Nagyon kellene már az eső mert az elvetett repcemagvak a talajban elfekszenek. Amennyiben rövidesen nem hullik jelentős mennyiségű csapadék az őszi kalászosok talajelőkészítését sem tudják időben elvégezni.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (38. hét)

Kukorica: növény száradás (BBCH 97)

Napraforgó: barnaérés-növény száradás (BBCH 89-97)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően közepes, de a lucernában és zöldtáppal elvetett területeken a populáció mérete folyamatosan nő.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények


A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukoricák nagyon vegyes képet mutatnak, a talaj vízgazdálkodása, az öntözés lehetőségétől függően. Sokfelé a levelek már teljesen leszáradtak, csövek csak a tövek egy részén vannak.

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) csapda továbbra is fog, bár a héten csökkenő mértékben.

A csőpenész a csővégi hernyó és kukoricabogár rágások helyén jelentkezik. Az eddigi száraz időjárás következtében egyelőre kis kiterjedésűek.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) újra rajzani kezdett augusztus utolsó napjaiban.



Gyapottok bagolylepke fogási adatok Darvas. Gyűjtő: Dr. Dávid István

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napaforgók jellemzően egészséges, zöld száron érnek, a lomb és a tányér száradása természetes úton idén kifejezetten lassú. Ezzel együtt a kaszat nedvességtartalma jelentős ütemben csökken, ami jelzi, hogy a termés lassan beérik, sőt az április első felében vetett állományok gyakorlatilag beértek. Ahol már történt betakarítás előtti gyomirtás, ott a hét meleg, száraz időjárásában látványos volt a száradás.


A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten Almában

A lisztharmat fertőzés továbbra is jelentős (15%).

Levélnázók kártételét nem észleltem. Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 3% körüli.

Takácsatka, vértetű jelenléte emelkedő tendenciát mutat.

Varasodás levéltünetei megfigyelhetők, kb. 5 %-os fertőzöttségi szinten.



Almamoly fogási adatok Debrecen. Gyűjtő: Dr. Radócz László

Egyéb információk:

Szőlő- Peronoszpóra stagnál 10% körüli tünetek. Egyes helyeken jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlőmoly fogás létszámok 08.24-10 db, 08.27-5 db, 08.31.-3 db.

Hamvas szilva levéltetű jelenléte 3% körüli fertőzöttség.

Szilvamoly továbbra is jelen van fogások 08.24.-45, 08.27.-36, 08.31-30 db.

Szilvadarázs-0 db. Amerikai fehér medvelepke útmenti bokron 1 helyszínen (Bodaszőlő bekötő út és 35. főút között).

Sáskák megjelenését nem tapasztaltam.

Szilvamoly továbbra is viszonylag nagyszámú fogások. Úgy tűnik, hogy a 2. és 3. nemzedék összefolyik. (A polifág úrlapon feltüntettem)

Poloskaszagú szilvadarázs gyakorlatilag eltűnt. Fogások: 0 db minden időpontban.

Cseresznyelégység esetében: 0 mindhárom augusztusi időpontban

Almában takácsatka levélkártétel látható, egyelőre alacsony szinten (kb. 5-8%).

A gyapottok bagolylepke megindult. A fogási adatokról a kukorica úrlapon írtam.

További fogás dióburok fűrólégy 08.24- 30 db, 08.27-18 db, 08.31.-22 db.

Debrecen, 2025.08.31.