




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

A héten naposabb, kora őszi, igazi „vénesszonyok” nyara volt. A héten egyszer esett eső, ami a betakarítást és a vetéseket szakította meg.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiák (36. hét)

Kukorica: növény száradás (BBCH 97)

Napraforgó: barnaérés-növény száradás (BBCH 89-97)

Repce: száraz mag (BBCH 00)

Polifág károsítók

A gyepekben, lucernában mindenfelé nagy egyedszámban fordul elő a mezei pocok (*Microtus arvalis*), de sok van a napraforgó és kukoricatáblákon is. A nyári betakarítású növények tarlóján változó a fertőzés mértéke, attól függően, hogy mennyi táplálékot találnak (pl. elpergett szemekből, árvakelésből), illetve mennyire volt ápolva a tarló.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A meleg, száraz időben a kukoricák érése és száradása gyors. A száraz időjárás a csővégi fuzáriumfertőzés terjedésének nem kedvez.

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) a héten is erős rajzást mutatott, de a kukoricák közül a késői csemegében lehet még veszélyes.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) a héten folyamatosan rajzott, a fogás közepes erősségű rajzásra utal.

Fuzáriumos csőfertőzés mértéke 6-7%.

Gyapottok bagolylepke fogás (Debrecen-Józsa): 09.02.-3db, 09.05-2 db, 09.08. - 0 db.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgók az érés különféle fázisaiban vannak, a vetésidőtől, talajadottságoktól függően. Egyes táblákon már elkezdődött a betakarítás, de a későbbi vetések még eléggé zöldek (ezzel együtt a kaszat nedvességtartalma arra utal, hogy a termés gyakorlatilag már beérett), és úgy tűnik, hogy ahol a természetes száradást kivárlják, ott legkorábban szeptember 2. felében lehetséges a betakarítás. Egyébként a szár és a tányérok kórtani állapota többnyire jó, bár helyenként lehet látni makrofomina fertőzésre utaló felsült foltokat. A csapadékos, párás időjárás a szürkepenésznek kedvez.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten repcében

A repcévetések egy része augusztus végén megtörtént. A közvetlenül augusztus 20 után hullott csapadék az egyöntetű keléshez kevés volt, azóta pedig csapadék nem hullott. Az elvetett repcék állapota így nagyon vegyes: van ahol 60-80 %-os a kelés, van ahol 20-30 %-os.

Debrecen, 2025.09.08.