




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten megyeszerte jelentős mennyiségű (40-60mm) csapadék hullott, markáns lehűlés kíséretében.




Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (37. hét)

Kukorica: növény száradás (BBCH 97)

Napraforgó: növény száradás (BBCH 97)

Repce: csírázás-kelés (BBCH 01-09)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően közepes, de a lucernában és zöldtápszelvényekkel elvetett területeken a populáció mérete folyamatosan nő.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A szemeskukorica betakarítása a környéken még nem kezdődött el, kivéve a kényszerbetakarítást, ahol szilázsként vagy egyéb tömegtakarmányként próbálták hasznosítani az aszály sújtotta állományokat.

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) a héten közepes rajzást mutatott.

A kukoricamolylepke (*Ostrinia nubilalis*) a héten gyenge rajzást mutatott a fénycsapdában.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgók az érés különféle fázisaiban vannak, a méregzöld állományoktól a betakaríthatóig. Egyes táblákon már elkezdődött a betakarítás. A szár és a tányérok kórtani állapota többnyire jó, bár helyenként lehet látni makrofomina fertőzésre utaló felsült foltokat. A héten kisebb-nagyobb esők estek, ez még befolyásolhatja a tányérok kórtani állapotát a még zöld állományoknál.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten repcében

A repce kelése nagyon elhúzódott a száraz időjárásban. Egységesen kikelt tábla nincs a környéken, a kikelt táblarészekeken pedig szik és 2 levél között van a repce. A héten hullott annyi csapadék, ami a még ki nem kell magvak csírázását megindíthatja, és a már kikelt növények túlélését, fejlődését segíti. A hézagosan kelt, eddig lassacskán fejlődő állományokban egyelőre jelentős rovarkártétel nincs.

Repcebolhát (*Psylliodes chrysocephala*) vagy a kártételét szórványosan lehet látni. A repcedarázs imágói is kisebb egyedszámban vannak a táblákon, mint ami a korábbi években jellemző volt, bár már a repcekelés első hullámától fogva jelen vannak, így várható a lárvakelés. Hernyó kártevők egyelőre nincsenek a fiatal repcéken, de rajzik a gyapottok bagolylepke, káposztalepke, káposztamolylepke, így várhatóan hamarosan megjelennek. Levéltetvek egyelőre nincsenek.

A mezei pocok a táblákon belül még gyenge fertőzést mutat, inkább a táblák szegélyében fordulnak még elő, onnan járnak be táplálkozni. A ritka állományokban szembetűnő a mezei nyúl kártétele: egyelőre nehéz megmondani, hogy ez okoz-e majd számottevő tőhiányt. A repce keléséhez hasonlóan a gabona árvakelés is nagyon vegyes: az első repcékkel kelt árvakelés 2-3 leveles, ahol nagyobb a sűrűsége, ott időszerű ellene a védekezés. A repce kétszikű magról kelő gyomjai egyelőre alig-alig keltek, de az e heti esők várhatóan több faj kelését megindítják.

Debrecen, 2025.09.15.