




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten megyénkben még szórványosan előfordult kisebb mennyiségű csapadék, de jellemzően kellemes őszi idő volt mely kedvezett a betakarítási munkáknak.



Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (38. hét)

Kukorica: növény száradás (BBCH 97)

Napraforgó: növény száradás (BBCH 97)

Repce: kelés-szikleveles állapot (BBCH 09-10)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően közepes, de a lucernában és zöldítéssel elvetett területeken a populáció mérete folyamatosan nő.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) harmadik nemzedékének a rajzása jelentősen gyengült, több kistájon megállt. A kifejlett lárvák a zöldítéseken, repce árvakeléseken és a még lábon lévő csemegekukoricában károsítanak.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) harmadik nemzedékének a rajzása az elmúlt heti hidegfront miatt a keleti régióban jelentősen gyengült, a megyénk jelentős részén befejeződött..

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgók az érés különféle fázisaiban vannak, egyre több a betakarítható állomány, de sok állományszárítás nélküli állományban a szár és a levelek késve és nagyon lassan száradnak. Egyébként az állományszárítások hatáskifejtéséhez is több időre volt szükség, mint általában. Többfelé folyik a betakarítás. A szár és a tányérok kórtani állapota többnyire jó, bár helyenként lehet látni makrofomina fertőzésre utaló felsült foltokat.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten repcében

A repce kelése nagyon elhúzódott a száraz időjárásban. A múlt hétvégi eső hatására megindult a repce kelése, így most egyrészt vannak kettős kelésű állományok (4 levél-sziklevél), másrészt most kelt szikleveles állományok. A Lumiposával kezelt repcéken rovarkártétel alig látható. A repcedarázs imágói is kisebb egyedszámban vannak a táblákon, mint ami a korábbi években jellemző volt, bár a néhol előforduló repce árvakeléseken szinte tarrágás is előfordul, így védelem nélkül azért lehet számottevő kártételre is számítani. Hernyó kártevők egyelőre nincsenek a fiatal repcéken, de rajzik a gyapottok bagolylepke, káposztalepke, káposztamoly, így várhatóan hamarosan megjelennek. Levéltetvek egyelőre nincsenek. A kis káposztalégy imágói megjelentek a repcetáblákon. A mezei pocok kisebb-nagyobb kolóniai mostmár a repcetáblák belsejében is előfordulnak, és megkezdtek az állomány kifoltozását. A repce keléséhez hasonlóan a gabona árvakelés is nagyon vegyes: az első repcékkel kelt árvakelés 3-4 leveles, de egy második, erősebb kelési hullám is megjelent az eső hatására. A repce kétszikű magról kelő gyomjai közül több faj kelése is megindult.

Debrecen, 2025.09.22.