




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt hétvégén egy hidegfront hatására meggyeszerre heves záporok alakultak ki, melyekből 20-30 mm csapadék hullott. A középhőmérsékleti értékek a sokéves átlag közelében alakultak.



Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levélnedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (39. hét)

Kukorica: növény száradás (BBCH 97)

Napraforgó: növény száradás (BBCH 97)

Repce: szikleveles-2 leveles állapot (BBCH 10-12)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően közepes, de a lucernában és zöldítéssel elvetett területeken a populáció mérete folyamatosan nő. A mezei pocok betelepülését a repce táblákra egyelőre nem tapasztaltuk, de a T fák kihelyezését a táblákra célszerű elkezdni.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A szemes kukorica betakarítása megindult, folyamatban van.

A csővégi kártétel mértéke táblánként eltérő, fuzáriumos csövek is előfordulnak.

A mezei pocok kártétele is megfigyelhető, terjedőben van.

A csemegekukoricában folyik a betakarítás, itt a seregélyek lepték el a táblát. A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) harmadik nemzedékének a rajzása jelentősen gyengült, több kistájon megállt.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) harmadik nemzedékének a rajzása az elmúlt heti hidegfront miatt a keleti régióban jelentősen gyengült, a megyénk jelentős részén befejeződött.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgók jelentős részét betakarították, de számottevő a közvetlenül betakarítás előtt álló állomány is. Helyenként vannak még le nem száradt, késői vetésű táblák is. A szár és a tányérok kórtani állapota sem romlott: szártörések, tányérrothadások nem növelik számottevő mértékben a betakarítási veszteséget. A korábban betakarított és meghántott táblákon elég jól kel a napraforgó árvakelése. 2,2-4,6t/ha -os termés átlagok vannak. Nedvesebb, párásabb területeken a fómás szárfoltosság nagyobb mértékben figyelhető meg, mint a többin. A fehér -és szürkepenész előfordul, de nem szembetűnő.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten repcében

A fejlettebb repcék 7-8 levelesek, de vannak 1 leveles állományok is. Néhány táblán 2-3 kelés hullám is volt, itt sziklevelestől 8 leveleseig mindenféle repce előfordul. Ez a gyomirtás és az őszi regulátorozás hatékony elvégzését eléggé megnehezíti.

A kelő repcét fenyegető kártevők ellen a Lumiposa elegendő védelmet adott: repcebolha (*Psyllodes chrysocephala*), repcedarázs ellen célzott védekezésre nem volt szükség. A ragacslap egyelőre a kis káposztalégy mérsékelt rajzásáról árulkodik, igaz hogy az eddigi száraz, meleg időjárás nem is kedvezett neki.

A gyapottok bagolylepke a héten tovább rajzott, bár az előző héthez képest jelentősen csökkent a feromoncsapda fogása (átlagosan napi 3-4 lepkére). A gabona árvakelés zöme kikelt, a kétszikű gyomok kelése azonban nagyon vegyes.

Levéltevőkkel egyelőre nem találkoztam a repcében, még szárnyas alakokat sem látok, a 7-8 leveles egyedeken sem.

A mezei pocok fertőzés rendkívül gyors ütemben nő a repcetáblákon: egyik hétről a másikra szinte tízszeresedik a járatok száma. Ezzel párhuzamosan gyarapszik a kipusztult foltok száma is.

Debrecen, 2025.09.30.