




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet


Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten ősziösen hűvösre váltott az időjárás. A csapadék az elmaradt vetési és betakarítási munkákat hátráltatta.



Az átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 7 napban Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása



Az elmúlt 7 napban a relatív páratartalom és a levél nedvesség alakulása Debrecenben

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara HBM-i szervezetének debreceni i-Metos állomása

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai 41. hét

Őszi árpa: első levél megjelenése-2 leveles állapot (BBCH 10-12)

Őszi búza: csírázás-első levél megjelenése (BBCH 09-11)

Repce: 4-6 leveles állapot (BBCH 14-16)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően közepes, de a lucernában és zöldtáskával elvetett területeken, kukorica, napraforgó tarlókon a populáció mérete folyamatosan nő. A mezei pocok tömeges betelepülését a repce és a gabona táblákra egyelőre nem tapasztaltuk, de a T fák kihelyezését a táblákra még nem késő elkezdni. **A dús repceállományok vonzóak a pockok számára, ezért a táblaszéleket célszerű néhány naponta ellenőrizni.**

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten őszi búzában

Az őszi gabonák vetése folyamatban van. Kelés egyelőre nem nagyon van, mert a szárazság miatt a talaj a vetésmélységben többnyire száraz. Ahol itt-ott nedves volt a talaj, ott elhúzódó egyenetlen kelés várható, ahol teljesen száraz, ott a majd valamikor érkező esővel lesz kelés. A mezei pocok már a táblán várja a gabona kelését, különösen a nemrég lekerült kultúrák (napraforgó, kukorica, cirok) után. Kelés híján egyelőre más károsítók tevékenységéről nem lehet beszámolni.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten repcében

A repce fejlettsége 4-8 levél között jellemző, a talaj nedvességi állapota eléggé vontatott fejlődést tesz lehetővé.

Gombás betegségek tünetei nem láthatók. A kártevők közül a mezei pocok kártétele jelentős: foltoszerű pusztulásokat okoz. A korai rovarkártevők ellen a Lumiposa elegendő védelmet adott, a káposztalégy rajzása mérsékelte. A levéltetvek betelepülését továbbra sem tapasztaltam. A gyapottok bagolylepke (*Pieris brassicae*) rajzása is abbamaradt még szeptember végén.

Debrecen, 2025.10.12.