




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Az elmúlt héten végig kánikula volt, csapadék sajnos nem esett. Hajdúszoboszló környékén jégeső pusztította a kapásokat.



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiák (28. hét)

Kukorica: teljes virágzás-virágzás vége (BBCH 65-69)

Napraforgó: teljes virágzás-virágzás közepe (BBCH 65-67)

Lucerna: harmadik növedék 10 cm

Alma: 50-70%-os gyümölcsméret (BBCH 75-77)

Polifág károsítók

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Amerikai szövőlepke hernyófészleleit egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

Az öntözetlen táblákban nagyon látszik az aszály hatása.

A kukoricák a címerhányás különféle fázisában vannak.

Öntözetlen területeken a víz hiánya és a hőség hatása megmutatkozott kukoricán, a héten látványosan furulyált, nehezen hányja ki a címert, és úgy tűnik, hogy sok tövön cső nem is lesz.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) első nemzedékének hernyói károsítják a növényeket.

A gyapottok bagolylepke kis számban rajzik, és kukoricabogarat (*Diabrotica virgifera*) is csak elvétve fogja a csapda, a növényeken pedig észrevehetetlen.

Kabócák szép számmal vannak az állományban.

Debrecen-Józsa - Gyapottok bagolylepke fogások: 07.01-3 db, 07.05.-6 db, 07.09-2 db

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgó a virágzás különféle fázisában vannak: sok állomány java virágzásban, de a későbbiekben is nyílnak az első virágok.

A hőség és a szárazság hatása meglátszik az állományokon: a déli, délutáni órákban kisebb-nagyobb mértékben lankadnak a levelek.

Levél- és szárbetegségek egyelőre nem látszanak.

Levéltetvek nincsenek, a tányérokban hernyó kártétel nem látszik. Kabócák és mezei poloskák jelenléte jellemző.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése a száraz kánikulai idő miatt megállt.


A varasodás (*Venturia inaequalis*) terjedése is megállt a száraz, kánikulai időjárás miatt.

Az almamoly (*Cydia pomonella*) a második nemzedék rajzása még nem kezdődött el.

Szőlőben a peronoszpóra minimális.

Tarka szőlőmoly fogások: 07.01-6db, 07.05-3 db, 07.09.-2 db.

Cseresznyelégység eltűnt.



Almamoly rajzás (*Cydia pomonella*) rajzás

Debrecen, 2026.07.07