




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Sajnos továbbra is csapadékmentes a július. Többször volt borult idő, de csapadék nem esett.



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiak (28. hét)

Kukorica: virágzás vége (BBCH 69)

Napraforgó: teljes virágzás-virágzás vége (BBCH 65-69)

Lucerna: harmadik kaszálás

Alma: 50-70%-os gyümölcsméret (BBCH 75-77)

Polifág károsítók


A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.


Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

A kukoricák többé-kevésbé kihányták a címet. A legnagyobb probléma továbbra is a vízhiány. A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) a héten ismét életjeleket mutatott, a képződő csöveken várható a károsítása. A kukoricabogár (*Diabrotica virgifera*) észlelés szintjén van, alig-alig lehet találni.



Gyapottok bagolylepke csapda fogás (Darvas - Dr. Dávid István)



Gyapottok bagolylepke csapda fogás (Pocsaj - Siteri Sándor)

A szemes kukoricák többsége alulról szárad felfelé, felülről pedig az UV hatása látszik, elszáradnak a levelek.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgó java virágzásban vagy a virágzás vége felé van. Kórtani problémákra utaló tünetek nincsenek, a legnagyobb problémát a vízhiány okozza: sokfelé az alsó levelek már leszáradtak, a növények nappal többfelé hervadoznak. Mezei poloskák mérsékelt-közepes fertőzést okoznak, levéltetvek nincsenek.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése tovább nőtt.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) terjedése is megállt a száraz, kánikulai időjárás miatt.

Az almamoly (*Cydia pomonella*) a második nemzedék rajzása szépen kezd felépülni.

A takácsatkák (*Tetranychus urticae*) tömegesen jelen vannak a fák alsó levelein, a kedvező időjárás miatt dinamikusán szaporodnak, jelentős kártétel várható.

Debrecen, 2026.07.14