




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Folytatódott a nyárhoz képest ritka, hűvös, borult időjárás. Kedden 0,4 mm, szerdán 3,4 mm, csütörtökön 0,2 mm, pénteken 3,2 mm esett. Sok helyen azonban már elkésett az eső, jelentős aszályt szenvedtek a kapások.



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiák (29. hét)

Kukorica: tejesérés (BBCH 73-75)

Napraforgó: virágzás vége-magképződés (BBCH 69-71)

Alma: 50-70%-os gyümölcsméret (BBCH 75-77)

Polifág károsítók

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények

A kukoricák virágoznak. A legnagyobb probléma továbbra is a vízhiány.


A gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) hernyók megjelentek a csővégeken.

A kukoricabogár (*Diabrotica virgifera*) fogás július közepén kissé emelkedett, de továbbra sem jelentős.


A amerikai kukoricabogárfogás jelentősen nőtt a héten a feromoncsapdában.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis*) 2. nemzedéke is elkezdett rajzani, bár a héten még viszonylag kis egyedszám volt a fénycsapdában (1-3 db/nap).


Gyapottok bagolylepkét nem fogja a feromoncsapda.



A kukoricabogár rajzása, Darvas (Dr. Dávid István)



A kukoricabogár rajzása, Hajdúszoboszló (Dalmi Izabella)



A Gyapottok bagolylepke rajzása, Darvas (Dr. Dávid István)

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

Szárfoltosságot, leveleken betegségek tüneteit nem lehet látni.

Szórványosan szklerotíniás szártőrothadás (*Sclerotinia sclerotiorum*) előfordul, illetve szórványosan tányérothadás is.

A legnagyobb problémát a vízhiány okozza: sokfelé az alsó levelek már leszáradtak, a növények nappal többfelé hervadoznak.

Mezei poloskák mérsékelt-közepes fertőzést okoznak, levéltetvek nincsenek. A gyapottok bagolylepke hernyói megtalálhatók a tányérokban: a fertőzés többnyire mérsékelt.

4

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

A lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzés jelentős (20%).

Levélnázók kártételét nem észleltem.

Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 3% körüli.

Takácsatka (*Tetranychus urticae*), vértetű jelenléte emelkedő tendenciát mutat.

Varasodás (*Venturia inaequalis* kezdeti levéltünetei megfigyelhetők, egyelőre 5 %-os fertőzöttségi szinten.

Sáskák is megjelentek, szórványosan előfordulnak.

Debrecen, 2026.07.21