




## MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Folyamatos a kánikula, csapadék sajnos megyénkben nem esett. Ez megpecsételte a növények sorsát.



Forrás: [www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/](http://www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/)

### A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

#### Fenológiaiák (31. hét)

Kukorica: viaszérés-sárgaérés (BBCH 85-87)

Napraforgó: citromérés (BBCH 83)

Alma: érés (BBCH 83-85)

## **Polifág károsítók**

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

A varjú okoz igen súlyos károkat a napraforgó tányérokban és kukoricacsöveket is szétfosztják, főleg a táblák szegélyein.

Az őzek is folyamatosan károsítanak a napraforgóban.

## **Szántóföldi növények**

### **A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában**

A kukoricák az érés valamilyen fázisában vannak, beleértve sok helyen a növény száradást is. A kukoricamolyt kis számban fogta a csapda a héten. Gyapottok bagolylepkéből és gamma bagolylepkéből is mérsékelt volt a heti fogás. A kártételük ugyan utat nyit a fuzáriumos csőpenész számára, de hetek óta még harmat sincs, így egyelőre nem tombol a betegség. A levelek jó része leszáradt, így a takácsatka fertőzés nem releváns. A kukoricabogár imágókat még fogja szórványosan a csapda: nem számottevő.

A kukoricatáblákban az aszály óriási károkat okozott. Kukoricák egy részét kényszersilózzák. Sok még arra sem alkalmas.

A csövek vége rovarkártevők által károsított, kukoricabogarak és a hernyók által. Itt táltalában megjelenik a penészgyep. Többnyire szürke, de van fehér és koromfekete penészbevonat is. Fuzárium, Aspergillus és még a golyvás üszög is gyakran előfordul. Alsó leveleken atkák is vannak már.

A másodvetésű csemegékben, szemes kukoricákban a bolhák most is nagy számban vannak, a kukoricabogár a leveleken károsít.

### **A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban**

A napraforgók eleje kezd átmenni citromérésbe, valószínűleg a hőség és a szárazság miatt felgyorsul az érés. Szárfoltosságok nincsenek, a tányérrothadás mértéke továbbra is 2% körül van. A gyapottok bagolylepke továbbra is károsít a tányérokban (táblától függően 5-15% a fertőzés). Az érés előrehaladtával egyre lárványosabb a madárkár (vetési varjú, seregély, galamb fajok), bár a nagyobb táblákon még nem kritikus a helyzet.

## **Kertészeti növények:**

### **A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában**

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése a száraz kánikulai idő miatt megállt.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) terjedése szintén a kánikulai időjárás miatt is megállt.

Az almamoly (*Cydia pomonella*) a második nemzedéke még mindig rajzik, a védekezések megkezdése az érettségtől függően még mindig indokolt.

A takácsatkák (*Tetranychus urticae*) tömegesen jelen vannak a fák alsó levelein, a kedvező időjárás miatt dinamikus szaporodnak, jelentős kártétel tapasztalható.

Debrecen, 2026.08.04.