




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Folytatódik az aszály. Az öntözetlen kukoricaállományok megsemmisültek. A napraforgók nagy része is aszályos tüneteket mutat.



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiak (32. hét)

Kukorica: sárgaérés-teljesérés (BBCH 87-89)

Napraforgó: citromérés-barnaérés (BBCH 87-89)

Alma:érés (BBCH 85-87)

Polifág károsítók

A kalászos és a repce tarlókon a mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően gyenge-közepes.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.


Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

Az öntözetlen kukoricák a növényszáradás fázisában vannak, sok táblán megtörtént vagy folyamatban van a kényszersilózás.

A gamma bagolylepke ebben a hónapban még nem fogta a feromoncsapda, és a gyapottok bagolylepke fogás is alacsony.

A kukoricabogár gyakorlatilag befejezte a rajzást: az idei fogás gyenge fertőzésről árulkodik.



Gyapottok bagolylepke előfordulás - Darvas

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgók érése a forró száraz időjárásban felgyorsult, sok állományban már 30% alatti a kaszatnedvesség.

A szárfoltosságok, levélbetegségek továbbra sincsenek (kivéve itt-ott egy minimális alternária fertőzést), a tányérrothadás is stagnál.

A gyengébb vízgazdálkodású táblarészekben már szárad a napraforgó: feltehetőleg nem kórtani eredetű, mert a vizsgált töveken nyoma sincs a makrofomina mikroszkleróciumainak. Inkább a gyökérvízhiányban jellemző teljes vízhiányra vezethető vissza.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a gyümölcsösben

Hamvas szilva levéltetű jelenléte 3% körüli fertőzöttség.

Szilvamoly továbbra is jelen van fogások 08.03.-36, 08.06.-31, 08.10-25 db.

Szilvadarázs-0 db. Amerikai fehér medvelepke útmenti bokron 1 helyszínen (Bodaszőlő bekötő út és 35. főút között).

Sáskák megjelenését nem tapasztaltam.

Szőlő- Peronoszpóra indul 6-7% körüli tünetek. Egyes helyeken jelentős a nemezes gubacsatka (5-10 %).

Tarka szőlómoly fogás létszámok 08.03-8 db, 08.06-5 db, 08.10.-6 db.

Szilvamoly továbbra is viszonylag nagyszámú fogások. Úgy tűnik, hogy a 2. és 3. nemzedék összefolyik. (A polifág úrlapon feltüntettem)

Poloskaszagú szilvadarázs gyakorlatilag eltűnt. Fogások: 0 db minden időpontban.

Cseresznyelégység esetében: 0 mindhárom augusztusi időpontban

Almában takácsatka levélkártétel látható, egyelőre alacsony szinten (kb. 5-8%).

További fogás dióburok fűrólégy 08.03- 10 db, 08.06-25 db, 08.10.-33 db

Debrecen, 2026.08.13