




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Csapadék továbbra sem esett. A kukorica kényszersilózása és cső nélküli kipusztulása jellemző a megyére. Napraforgók is kezdenek aszályos és kényszerérési tüneteket mutatni.



A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiák (34. hét)

Kukorica: sárgaérés-teljesérés (BBCH 87-89)

Napraforgó: citromérés-barnaérés (BBCH 87-89)

Alma:érés (BBCH 89)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jelenleg alacsony. A fő károsítási forrás a a lucerna, és egyéb szálas pillangós vetések.


A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.

Szántóföldi növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

Az öntözetlen kukoricák a növény száradás fázisában vannak, sok táblán megtörtént vagy folyamatban van a kényszerzilózás.

A gamma bagolylepkét (*Autographa gamma*) ebben a hónapban még nem fogta a feromoncsapda, és a gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) fogás is alacsony. A fénycsapda azonban rendszeresen fogja a gyapottok-bagolylepkét, így a jelenléte úgy tűnik most is folyamatos. A kukoricabogár gyakorlatilag befejezte a rajzást: az idei fogás gyenge fertőzésről árulkodik.



A gyapottok-bagolylepke rajzásának alakulása Darvason

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A napraforgók érése a forró száraz időjárásban felgyorsult, sok állományban már 20% alatti a kaszatok nedvességtartalma. A szárfojtosságok, levélbetegségek továbbra sincsenek (kivéve itt-ott egy minimális alternária fertőzést), a tányérrothadás is stagnál. A gyengébb vízgazdálkodású táblarészekben már szárad a napraforgó: feltehetőleg nem kórtani eredetű, mert a vizsgált töveken nyoma sincs a makrofomina mikroszkleróciumainak. Inkább a gyökérszónában jellemző teljes vízhiányra vezethető vissza.

A napraforgótáblákban egyre nagyobb Macrophomina okozta barnuló foltok és egyre több Rhizopusz egyed láthatóak. Az aszály tovább pusztít, a varjak és őzek mellett. Poloskák mindenhol előfordulnak.

Jelenős a madarak által kivert szemek nagysága.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Az almában még nem kezdődött el a betakarítás, a felkészülés már elkezdődött.

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) fertőzése a száraz kánikulai idő miatt megállt.

A varasodás (*Venturia inaequalis*) terjedése szintén a kánikulai időjárás miatt is megállt.

Az almamoly (*Cydia pomonella*) a második nemzedékének befejeződött a rajzása, folyamatos a tojásrakás.

Az almailonca és az aknázómolymok rajzása is befejeződött, az idén már nem kell a kártételükkel számolni.

Debrecen, 2026.08.18