




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

A le nem silózott kukorica termések nagyon alacsonyak, egy tonna körüliek. A napraforgó betakarítása a napokban indul, 0,8-1 tonna/ha körüli termések vannak. Nagyon súlyos az aszály, gyakorlatilag minden növény, még az öntözött kultúrák is megszenvedték.



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiaiak (35. hét)

Kukorica: sárgaérés-teljesérés (BBCH 87-89)

Napraforgó: citromérés-barnaérés (BBCH 87-89)

Alma:érés (BBCH 89)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) lucernában és zöldugar területeken figyelhető meg a populáció növekedése.


A hörcsög (*Cricetus cricetus*) kártétele egyelőre nem tapasztaltó.

Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

Az öntözetlen kukoricák a növénysszáradás fázisában vannak, sok táblán megtörtént vagy folyamatban van a kényszersilózás.

A feromoncsapdában a gyapottok bagolylepke fogás alacsony. A fénycsapda azonban rendszeresen fogja a gyapottok-bagolylepkét (*Helicoverpa armigera*), így a jelenléte úgy tűnik most is folyamatos.



A gyapottok-bagolylepke rajzásának alakulása Darvason.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

A sárgaéréstől a teljesen száraz állományig mindenféle napraforgó előfordul, akár táblán belül is nagy eltérések lehetnek. A szárfoltosságok, levélbetegségek többsége még észlelési szinten sem volt idén, a tányérrothadás is alacsony szinten stagnál. Csapadék egyáltalán nincs, még reggeli harmat sem, így nem várható, hogy a tányérbetegségek teret nyernének a hátralévő időben.

Kertészeti növények:

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában

Az almában a lisztharmat (*Podosphaera leucotricha*) és varasodás (*Venturia inaequalis*) terjedése a csapadékos, változókéony időjárás miatt jelentős..

Az almamoly (Cydia pomonella) a második nemzedékének befejeződött a rajzása, folyamatos a tojásrakás.

Az almailonca és az aknázómolyok rajzása is befejeződött, az idén már nem kell a kártételükkel

Levélnaknázók kártételét nem észlelhető.

Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 3% körüli.

Takácsatka, vértetű jelenléte emelkedő tendenciát mutat.

Őszibarack:

A Tafrinás levélfoltosság gyakorlatilag eltűnt az őszibarackban.

Továbbra is kismértékű a zöld őszibarack levéltetű fertőzöttség: 3 %.

Moniliás gyümölcsfertőzés egyelőre kismértékben tapasztalható (5%).