




MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet

Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe

Napraforgó betakarítása zajlik. A kukorica állomány megsemmisült. Őszi vetések nem kezdődtek el.



Forrás: www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/aszalyinfo/

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények

Fenológiai (38. hét)

Kukorica: növényszáradás (BBCH 97)

Napraforgó: barnaérés-növényszáradás (BBCH 89-97)

Polifág károsítók

A mezei pocok (*Microtus arvalis*) fertőzöttség jellemzően közepes, de a lucernában és zöldítéssel elvetett területeken a populáció mérete folyamatosan nő.

A hörcsög (*Cricetus cricetus*) megjelenését, kártételét egyelőre nem tapasztaltuk.


Szántóföldi növények

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában

Az öntözetlen kukoricák a növény száradás fázisában vannak, sok táblán megtörtént vagy folyamatban van a kényszer silózás. A feromoncsapdában a gyapottok bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) fogás alacsony. A fénycsapda azonban rendszeresen fogja a gyapottok-bagolylepkét, így a jelenléte úgy tűnik most is folyamatos.

A szemes kukoricákban nemcsak a csővégek penészesek, hanem a csövek közepe táján is látható penészgyp. Termékenyülési problémák is látszanak.

A kukoricák nagyon vegyes képet mutatnak, a talaj vízgazdálkodása, az öntözés lehetőségétől függően. Sokfelé a levelek már teljesen leszáradtak, csövek csak a tövek egy részén vannak.



Gyapottok bagolylepke fogási adatok Darvas. Gyűjtő: Dr. Dávid István

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a napraforgóban

Egyre több napraforgóban már előrehaladott az érés. Sok táblán foltokban vagy egészében leszáradt az állomány, de vannak még jelentős zöld lombbal rendelkező táblák, táblafoltok is. A betakarítás elkezdődött, bár egyelőre még kisebb területen. A napraforgók jelentősebb kórtani problémák nélkül jutottak el érésig. Szárfoltosságok egyáltalán nincsenek, a tányérbetegségek aránya is viszonylag alacsony. A tányérokon többnyire sebzések nyomán kialakult botritiszes vagy rhizópuszos rothadás látható.

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten Almában

A lisztharmat fertőzés továbbra is jelentős (15%).

Levélnázók kártételét nem észleltem. Almalevél pirosító levéltetű jelenléte egyes fajtákon 3% körüli.

Takácsatka, vértetű jelenléte emelkedő tendenciát mutat.

Varasodás levéltünetei megfigyelhetők, kb. 5 %-os fertőzöttségi szinten.

Debrecen, 2026.09.01.