

Károsítóhelyzet alakulása

Zala megye, 2020.09.07.-09.14.

Időjárás:

A múlt héten hasonló időjárás uralkodott mint az előző időszakban. Nagyrészt késő nyári idő volt jellemző, csapadék mentesen. A minimum hőmérsékletek 6,9-12,7 fok; maximum: 22,7-27 fok (átlag: 14,6-17,9 fok) között alakultak. A páratartalom továbbra is magas volt 80 % feletti. Jelentős volt a páralecsapódás.

REPCE ÁRVAKELÉS, REPCE

Repce árvakelés: ~6 leveles állapot, a fejlődésük stagnál. A károsítóhelyzet tekintetében sem látható jelentős változás. A bolhák népessége és kártétele alacsony szintű, a repcedarázs szintén alacsony egyedszámmal és kártétellel van jelen.

Repce fővetés: vetés, kelés-szik-kétleveles állapot.

A szik-kétleveles **repcében** megjelentek a **levéltetvek** első egyedei (Banks-féle skála 1-es fokozat) (1. fotó). Az állományokat figyelni kell mert a további meleg, párás időjárás esetén felszaporodásuk valószínűsíthető. A repcén (is) előforduló levéltetvek a tarlórépa sárgaság vírus terjesztéséért felelősek lehetnek ezért az ellenük való időben történő védekezés fontos.

Egyéb kártétel nem jellemző az állományokban.

A pre-és korai posztemergens **gyomirtásokra** fel kell készülni.



1. fotó: Levéltetvek első egyedei a kelő-2 leveles repcén

KUKORICA

Növényfenológia: érés.

A **fuzáriumos csőfertőzöttség** mértéke továbbra is gyenge mértékű (3-as skála, 6-25 %) az állományokban, de lassan növekvő.

A **kukoricabogár** imágóinak rajzása folyamatos, csökkenő fogással a kombinált csapdákból (50-70 db imágó/csapda/hét monokultúrás táblákon).

GYÜMÖLCS-FÉLÉK (SZILVA, DIÓ)

Növényfenológia:

Alma, körte: szüret folyamatos

Cseresznye, meggy: betakarítás utáni állapot; szilva: betakarítás vége

Dió: betakarítás.

Szilvában a **szilvamoly** rajzása folyamatos, de már csak észlelési szintű.

Csonthéjasokban a **keleti gyümölcsmoly** rajzása szintén folyamatos, csökkenő egyedszámú 6-10 db hím/csapda/3 nap mennyiséggel a feromon csapdákból.

Dióban továbbra is folyamatos, és csökkenő egyedszámú a **nyugati dióburok-fúrólégy** rajzása. A táplálék attraktáns csapdák fogása 15-35 db imágó/csapda/hét mennyiség között alakult, továbbra is a nőstények ~90-95%-os aránya mellett. A termések feketedése, hullása folyamatos, ezzel párhuzamosan a lárvák talajba húzódása, bábozódása is.

SZŐLŐ

Fenológia: szüret folyamatos (cukortartalom emelkedő, kedvező 16-18 fok).

Szőlőben a **peronoszpóra** és **lisztharmat** fertőzöttség nem változott a múlt héthez képest. Gyenge-közepes fertőzöttség jellemző ültetvénytől függően.

A **botrítisz** tünetei a legtöbb ültetvényben fokozódtak (2. fotó). A vékony héjú fajták (pl.: hárslevelű, kabar stb.) bogyórepedése, azon a botrítisz megtelepedése sok helyen jellemző a korábbi gombaölőszeres kezelésekre. A rothadásos betegségek kialakulásához hozzájárult a késői lisztharmat fertőzések következtében fellépett bogyórepedés is.

A sérült, fertőzött felületeken a muslicák nagy tömegben jelentek meg, melyek a termés minőségét tovább rontják. A muslicák közül a **feltösszárnyú muslica** terjedése szőlőben is jelentős mértékű. A kihelyezett almaecetes (és egyéb) csapdák fogása jelentős nagyságrendű, helyenként 170-200 db vagy afelett alakul egy hét alatt. A feltösszárnyú muslica kártétele főleg másodlagosan jellemző a sérült fürtökön, de túlrejtett (még ép bogyójú) fürtön előfordulhat elsődleges kártétel is. Azokban az ültetvényekben ahol a muslicák nagy tömegben fordulnak elő, a későbbi fajták esetében egy piretroidos kezelés még beleférhet a technológiába.



2. fotó: Fokozódó botrítisz fertőzés szőlőn

Zalaszentlőrinc, 2020. szeptember 14.

Tűh Annamária
előrejelző