

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2020.09.21.-09.28.

Időjárás:

A múlt héten eleinte folytatódott a szárazság, majd a hétvégére megérkezett az eső. Megyeszerte 35-58 mm közötti csapadék hullott ~2-3 nap alatt. A hőmérsékleti értékek tovább csökkentek, az éjszakai hőmérsékletek 1,6-11,2 fok között, a nappali hőmérsékletek 13,3-23,9 fok között alakultak (átlag: 8,1-16,4 fok). A páratartalom továbbra is magas volt 80 % feletti. Jelentős volt a páralecsapódás.

REPCE

Növényfenológia: szik-2-4 leveles állapot.

A repcének (is) nagyon jól jött a csapadék, a napokban lendületes fejlődésre számíthatunk. A szik-kétleveles és a korábban vetett 4 leveles **repcében** szinte mindenütt megfigyelhetők a **levéltetvek** egyedei. A fertőzöttség továbbra is gyenge mértékű, nem emelkedett (Banks-féle skála 1-es fokozat).

A **repcedarázs** imágóinak a száma csökkent a csapdafogások alapján, 2-6 db imágó/csapda/3 nap egyedszámmal. A tojásrakás nyomait továbbra is nagyon kell keresni, észlelési szintűek.

Megjelentek az érzékeny hibrideken/fajtákon a **repceperonoszpóra** tünetei, a levélfonákon már sporuláló foltokkal. A csapadékos, párás időjárás kedvez a betegség terjedésének.

A korai posztemergens **gyomirtások** továbbra is aktuálisak.

ALMA, KÖRTE, CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), DIÓ

Növényfenológia:

Alma, körte: szüret folyamatos

Cseresznye, meggy: betakarítás utáni állapot; szilva: betakarítás vége

Dió: betakarítás.

Dióban még észlelhető a **nyugati dióburok-fúrólégy** rajzása, 1-3 db imágó/csapda/hét fogással a csapdákból. A mostani esővel újabb nagyobb mennyiségű termés hullott le a fákról.

A dió lombhullása is jelentős a kezeletlen fákban. A nagymértékű, idő előtti lombhullást a helyenként erős mértékű **gnomóniás-és baktériumos betegségek** okozzák elsősorban. Ahol lehetséges a lomb összegyűjtése, komposztálása javasolt.

SZŐLŐ

Fenológia: szüret folyamatos

Szőlőben az elmúlt héten a **lisztharmat** erősödése volt megfigyelhető az érzékeny fajták levelein. A kazmotéciumok érése folyamatos.

A **botrítisz** fertőzésveszélye a későbbi fajtákon még jelentős lehet, ezért ahol még lehet, javasolt a védekezés.

A szárazabb napokon a **musicák** száma kissé csökkent, de jelenleg újra növekedés látszik a csapdafogások alapján.

A **ESCA-s és fitoplazmás** szőlőtőkék még jól felismerhetők az ültetvényekben, ezért ezeket célszerű megjelölni (ha elégséges akkor csonkolni) és a lehető leghamarabb kivágni (a fitoplazmás tőkéket).

Zalaszentlőrinc, 2020. szeptember 28.

Tűh Annamária
előrejelző