

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2020.10.05.-10.12.

Időjárás:

A múlt héten folytatódott az esős és kissé hűvösebb időjárás. Újabb 48-50 mm-nyi eső hullott a megye területén, melynek következtében a talajok feláztak, sok helyen a betakarítási, vetési munkálatok elakadtak. A hőmérséklet tovább csökkent (az előző héthez képest), a minimum hőmérsékletek 2,5-7,7 fok, a maximumok: 7,7-19,5 fok között alakultak (átlag: 4,7-12,8).

REPCE

Növényfenológia: 4-(6) leveles állapot.

Repceben a **repcedarázs** imágóinak a száma továbbra is alacsony, (2-3 db imágó/csapda/3 nap). A tojásrakás észlelési szintű. Egyértelmű kártétel csak nagyon kevés táblán látható (a repcedarázs álhernyójának jelenlétével). Néhány állományban láthatók kisebb-nagyobb mértékű rágásnyomok de ezek inkább bagolylepke hernyók kártételei. A **levéltetvek** fertőzöttsége változatlan, gyenge mértékű.

A **repceperonoszpóra** tünetei nem növekedtek a fertőzöttség egy-egy növényen legfeljebb gyenge fokozatú.

A 4-6 leveles fejlettségű állományok **regulátorozására** fel kell készülni.

GABONA-FÉLÉK

Őszi árpa: 1-3 leveles.

Őszi búza: talaj előkészítések folyamatban, vetés kezdete.

Az 1-3 leveles őszi árpa táblákon folytatódott (még ha mérsékelten is) a **levéltetvek** felszaporodása, a fertőzöttség gyenge mértékű. Szárnyas és szárnyatlan egyedek is megfigyelhetők. Észlelési szinten megjelentek valószínűleg a **levélbetegségek** első kis foltjai (nagyon kezdetleges tünetek ezért a betegség beazonosítása még bizonytalan). (1. fotó)



1. fotó: Levéltetvek kis kolóniái és levélbetegségek észlelési szintű tünetei őszi árpán

KUKORICA

A kukorica betakarítása részben megkezdődött a megyében. A felázott talajra a kombájnnal sok esetben szinte lehetetlen rámenni. A víztartalom még magas, 26-28 % körül alakul.

SZŐLŐ

Fenológia: egy-egy táblán a késői fajták még fent vannak.

Szőlőben betegségek vonatkozásában nem történt változás. A kisebb ültetvényekben, érzékeny fajták levelein közepes lisztharmat és peronoszpóra fertőzöttség nyomai láthatók. A lisztharmat termőtestekérésének azonban a jelenlegi időjárás nem kedvez, így ha hasonló marad az időjárás a továbbiakban is, akkor nagymértékű áttelelésre nem kell számítanunk. A peronoszpóra lombfertőzöttsége minden (kisebb-nagyobb) ültetvényben jelentősebb, az ún. mozaikos foltok nagy gyakorisággal fordulnak elő a leveleken. Az áttelelő fertőző anyag mennyiség adott, számottevő, de az áttelelés sikerét majd a téli időjárás határozza meg.

A **muslicák** előfordulása továbbra is jellemző az ültetvényekben, jelenlétüknek azonban növényvédelmi vagy borászati szempontból már nincs jelentősége (DROSSU: 120-150 db imágó/csapda/hét, a hímek 90-95 %-os arányával a nőstényekkel szemben).

Zalaszentlőrinc, 2020. október 13.

Tűh Annamária
előrejelző