

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2021.03.29-04.05.

Időjárás:

Az elmúlt héten folytatódott a szárazság, eső csak 1-2 nap hullott, csekély, 2-3 mm-nyi mennyiségben. A hét nagy részén jelentős felmelegedés volt jellemző (24-27 fokos maximum hőmérséklettel), rendszerint intenzív szélmozgás mellett. Ez a körülmény az aszálytüneteket tovább fokozta.

A húsvéti hétvégére újabb lehülés érkezett, erős széllel. A minimum hőmérsékletek -4,0 és +8,0 fok között (2 nap), a maximumok 13,0-27 fok között alakultak.

A talajhőmérséklet emelkedett (átlag: 7,1-14,2 fok – 10 cm mélységben).

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA

Növényfenológia:

Őszi árpa: bokrosodás vége, őszi búza: bokrosodás (átlagosan 5-7 mellékhajtás).

A gabonafélék bokrosodásához, szárba indulásához nagy szükség lenne a csapadékra, ennek hiányában fejlődésük lassúbb (a műtrágyaszórások ellenére is) és ha tartósan marad ez az állapot, a termés kilátások is gyengébbek lesznek.

Károsítók:

A gabonafélékben nem sok változás történt a betegségek tekintetében. A szárazság kedvezőtlen azok felszaporodásához.

Őszi búzában továbbra is a **szeptóriás foltosság** gyenge mértékű tüneteivel találkozhatunk elsődlegesen. A betegség terjedése nem mérhető a múlt héthez viszonyítva.

A **rozsdabetegségek** tüneteinek maradtak észlelési szinten, **lisztharmat** tüneteket pedig egyelőre nem látni.

A **vetésfehérítő bogarak** betelepődése folyamatos, enyhén emelkedő számú, de még így is viszonylag alacsony. Őszi árpában 3-6 db imágó/10 hcs, míg őszi búzában kevesebb, 2-4 db imágó/10 hcs értékkel hálózunk a kártevőt a táblák belsejében is!

Őszi árpában a hálózatos levélfoltosság fertőzöttsége maradt gyenge, egy-egy táblán közepes mértékű az alsó leveleken.

A **gyomnövények** fejlődése folyamatos, habár a szárazság miatt lassúbb a táblákon. Ahol szükséges, ott a tavaszi gyomirtások már elvégezhetők (a fagyos napokat lehetőleg mellőzve).

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

Növényfenológia: A repce állományok fejlődését is hátráltatja a szárazság. Az állományok szár megnyúlása folyamatos, bár a növekedésük lassú. A rejtett zöldbimbós - zöldbimbós állapot jellemző mindenütt.

Károsítók:

A **repceszár-ormányos** és a **nagy repceormányos** második betelepedési hulláma valószínűleg tart, legalábbis ott, ahol nem védekeztek. A kártevők egyedszáma a védett táblákon alacsony. A szeles időjárás a sárgatálak fogásait megtévesztően befolyásolhatja, ezért az állományt is vizsgáljuk át tüzetesen minden alkalommal.

A **repcefénybogár** betelepedése folyamatos de csak egy-egy kedvező fekvésű táblán jelentősebb (itt 2-3 db imágó/virágzat mennyiségű). A megye déli-délnyugati területein néhány esetben már indokolt volt ellenük a beavatkozás. A felmelegedéssel a kártevő egyedszámának növekedése várható.

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), ALMA

Növényfenológia:

Szilva: zöldbimbós állapot;

Cseresznye, meggy: zöldbimbós állapot – fehérbimbós állapot kezdete;

Alma, körte: zöldbimbós állapot – fehér-és piros bimbós állapot kezdete;

Kajszi: teljes virágzás, virágzás vége-kötődés.

Kajsziban az újabb rügyszámítások eredménye alapján eddig összességében ~45-50 %-os fagykár látható. (A korábban károsodott rügyek lehullottak, a napokban ~5-10 %-os kár alakult ki.).

Károsítók:

Almában a **levélpirosító levéltetű** tojásaiból kikelt ősanya lárvák kártétele már megfigyelhető. A legtöbb helyen a kártételek még csak gyenge mértékűek, de azok növekedése valószínű. A védekezések aktuálisak.

A **varasodás** tömeges aszkospóra szóródása az esős napokkal következik be, ezért és a fertőzésre érzékeny fenológiai stádiumok miatt a megelőző védekezés javasolt.

Körtében a **körtelevélbolha** tojásrakása intenzívvé, tömegessé vált. Lárvakelést még nem tapasztaltunk, de napokon belül várható. A védekezésre fel kell készülni.

Csonthéjasokban (kajsziban, meggyben, cseresznyében) a **monilia** elleni védekezések továbbra is aktuálisak.

Zalaszentlőrinc, 2021. április 5.

Tűh Annamária
előrejelző