

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2021.04.05-04.12.

Időjárás:

A múlt héten folytatódott a szárazság, eső legfeljebb csak nyomokban hullott. A szél szinte folyamatosan fújt, amely a talajok felső rétegét tovább szárította. Az időszak elején jelentős lehűlés érte el a megyét, több napon keresztül jóval 0 fok alatti hőmérséklettel, mely a gyümölcsféléket kitettségétől függően különböző mértékben károsította. A minimum hőmérsékletek +7 és -7 fok között, a maximum hőmérsékletek +7-16 fok között alakultak. A talajhőmérséklet sem emelkedett az időszakban, átlagosan 3,8-10,5 fok között volt mérhető, 10 cm mélységben.

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA

Növényfenológia:

Őszi árpa: szárbaindulás-1 nóduszos állapot; Őszi búza: bokrosodás.

Az őszi árpa alsó levelei a szárazság és a levélfoltosságok együttes fellépése miatt ~80-90-ban elszáradtak.

Károsítók:

A gabonafélékben nem sok változás történt a betegségek tekintetében. A szárazság továbbra is kedvezőtlen azok felszaporodásához.

Őszi búzában a **szeptóriás foltosság** gyenge mértékű tünetei nem növekedtek az előző időszakhoz viszonyítva. Az alsó levelek fertőzöttsége elsősorban a betegségre érzékeny állományokban figyelhető meg. A betegség fertőzésveszélye alacsony szintű, részben a gyakori, szélsőséges lehűlések, részben az aszály miatt. Emellett a szinte folyamatos szélmozgás hamar felszárítja az állományokat, lerövidítve ezzel a spórák csírázásához alkalmas időszakot.

A **rozsdabetegségek** tünetei maradtak észlelési szinten, **lisztharmat** tüneteket pedig egyelőre nem látni.

A **vetésfehérítő bogarak** betelepődése folyamatos, a napsütéses napokon enyhén emelkedő számú, de a legtöbb táblán alacsony. Őszi árpában az érési táplálkozás nyomai mellett, megfigyelhetők már az első tojások is.

Őszi árpában a **hálózatos levélfoltosság** fertőzöttsége kismértékű emelkedéssel (2-es fokozat) továbbra is gyenge mértékű maradt (egy-egy táblán közepes mértékű az alsó leveleken). Az újabb, észlelési szintű tünetek a felsőbb leveleken figyelhetők meg.

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

Növényfenológia: Zöldbimbós-sárgabimbós állapot.

A repce fejlődése részben a szárazság, részben a hűvös idő miatt visszafogott, a tavalyihoz hasonlóan, idén is rendkívül alacsony állományokat lehet látni.

Károsítók:

A **repceszár-ormányos és a nagy repceormányos** második betelepődési hullámát derékba törte a lehűlés (és a védekezések). A kártevők észlelési szinten találhatók a sárgatálakban.

A **repcefénybogár** betelepítése folyamatos, de a hűvös idő miatt lassú ütemű. Az egyedszám táblaszintű ellenőrzése nagyon fontos, (különösen a napsütéses napokon) mert technológiától, a tábla kitettségétől függően nagyon különböző fertőzöttség tapasztalható. Egy-egy táblán virágzatunként 4-6 db fénybogár is előfordul, mely a repce jelenlegi fenológiájában azonnali beavatkozást igényel. Amennyiben marad a hűvös időjárás, a repce elhúzódó bimbós állapotára, fejlődésére számíthatunk, amely növeli a kártételi veszélyt.

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), ALMA

Növényfenológia:

Szilva: fehérbimbós állapot-virágzás kezdete;

Cseresznye, meggy: fehérbimbós állapot-virágzás kezdete;

Alma, körte: piros-és fehér bimbós állapot;

Kajszi: virágzás vége-kötődés.

Az újabb fagyos napok, a fagyzugos területeken jócskán megtizedelték a várt gyümölcstermést. A még túlélő kajszi virágok a múlt heti mínusz 4-7 fokos fagyokkal végképp károsodtak. Gyakori a 100 %-os fagykár. Ez a lehülés a cseresznye-és meggy termést is veszélyeztette, kedvezőbb esetben 65-75 %-os fagykárral szembesültünk, de sajnos nagyon gyakori a 100 %-os károsodás is. A cseresznyét-meggyet a hideg fehérbimbós állapotban érte. A virágok károsodása első ránézésre még most sem egyértelmű mert a szíromlevelek nem feltétlenül barnultak a fagy hatására, a bibe azonban igen.

A szintén fehérbimbós szilvában jelenleg ~20-30 %-os fagykár tapasztalható.

Károsítók:

Gyümölcsfélékben (alma, körte, szilva) a **poloskaszagú darazsak** rajzása folyamatos, szakaszos és a csapda fogások alapján alacsony egyedszámú. A bimbókon már megfigyelhetők a lerakott tojások, a védekezés időszerű.

Almában a **levélpirosító levéltetű** kártétele nem változott jelentősen (gyenge mértékű), ahol még nem tették, ott a védekezések indokoltak és aktuálisak.

A rovarölőszeres beavatkozások elvégzésekor tartsuk szem előtt a **méhek fokozott védelmét!**

A virágzó kultúrákban, mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, valamint ha az ültetvényt a méhek bármely okból látogatják, a védekezéseket méhkímélő technológiával (vagy méhekre nem jelölésköteles készítménnyel) végezhetjük el!

A csapda fogások alapján megindult az **almalevél-aknázómoly**, a **szilvamoly** és a **keleti gyümölcsmoly** rajzása.

A **varasodás** tömeges aszkospóra szóródására az esős napokkal számíthatunk. A megelőző védekezés javasolt.

Körtében a **körtelevelbolha** tojásrakási intenzitása stagnáló. Lárvakelés a hűvös időjárás miatt még nem tapasztalható.

Csonthéjasokban (kajsziban, meggyben, cseresznyében) a **monilia** elleni védekezések továbbra is aktuálisak.

Ribiszkén a **levélpirosító levéltetű** kártétele fokozódott (még gyenge mértékű, 2-es fokozat), a védekezés aktuális és indokolt.

Zalaszentlőrinc, 2021. április 12.

Tűh Annamária
előrejelző