

Károsítóhelyzet alakulása

Zala megye, 2021.08.09-08.16.

Időjárás:

Az elmúlt héten folytatódott a kánikulai meleg 28-33 fokos maximum hőmérsékletekkel (minimum: 12,9-15,3 fok; átlag: 20,0-23,1 fok). Csapadék mindössze 2 nap hullott, melynek nagy része 28-30 mm a hétvégén esett, heves zivatarok, és erős szél kíséretében.

Az időszak folyamán magas volt az UV sugárzás, a páratartalom 70 % felett alakult mindvégig.

KUKORICA

Növényfenológia: tejes éréstől viaszérés kezdetéig.

Károsítók:

A kukorica alsó 4-7 levele egy-egy táblán teljesen felszáradt, a gyengébb termőhelyeken gyakori a felső levelek erős mértékű **takácsatka** fertőzöttsége is (a fertőzött levelek sárgulása, száradása folyamatos).

Kukoricában a **kukoricamoly** második nemzedékének rajzása folyamatos, 3-6 db imágó/csapda/3 nap fogással a fénycsapdában.

A **kukoricabogár** egyedszáma stagnáló (egy-egy érésben előrehaladott állapotú táblán csökkenő), a tojásrakás folyamatos.

Góc-szerűen jellemző a gyapottok bagolylepke csővégi károsítása nyomán a **fuzáriumos csőfertőzés** fellépése. A fertőzés mértéke gyenge mértékű (csak a csővég érintett), de az állományon belüli gyakoriság növekvő, ~3-4 %-os. A párás, meleg időjárás kedvez a betegség erősödéséhez, melyet a hétvégi nagy mennyiségű csapadék is elősegít.

NAPRAFORGÓ

Növényfenológia: citromérés.

Napraforgóban a betegségek erősödése általános a táblákon.

Az **alternáriás foltosság** a leveleken közepes mértékben (4-es skála – 26-50 %), a száron és a tányérokban gyenge mértékben figyelhető meg. A tányérokban a betegség fellépése folyamatosan növekvő (gyenge fertőzöttség, de 2-es skálafokozat – 6-10 %).

Az érzékeny állományokban a **diaportés betegség** erősödése elsősorban a leveleken jellemző, az alsó 5-7 levél fertőzött, közepes mértékben (3-4 skála – 11-50 %).

A sebzéseken, sérülések környezetében megjelent a **rizópuszos és a botrítiszes tányérfertőzöttség** az állományokban (gyenge fertőzöttség). A csapadékos, párás időjárási körülmények kedveznek az újabb fertőzésekhez, legfőképp a viharban megdőlt, sérült állományokban.

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), ALMA, DIÓ

Növényfenológia:

Szilva: gyümölcsszínéződés-érés;

Alma, körte: gyümölcsnövekedés-színéződés, korai fajták: betakarítás folyamatos;

Károsítók:

Almában a csapda fogások alapján az **almamoly** rajzása folyamatos, enyhén növekvő (10-16 db imágó/csapda/3 nap). Az **almalevél-aknázómoly** rajzása folyamatos, csökkenő. Az újabb aknák megjelenése gyakori a leveleken de a fertőzöttség így is csak gyenge mértékű (2-es skála – legfeljebb 2-3 akna/levél). Az **almafalisztharmat** és az **almafa varasodás** levél-és gyümölcstünetei nem növekedtek (közepes-erős (3-5-ös skála, 11-75 %). Csonthéjasokban a **keleti gyümölcsmoly** rajzása folyamatos, alacsony számú, 20-22 db imágó/csapda/3 nap fogással a csapdákbán.

Szilvában a **szilvamoly** rajzása folyamatos, szintén gyenge erősségű, 16-18 db imágó/csapda/3 nap fogással. A terméshullás intenzív, a viharos napokon fokozódott.

Cseresznyében, meggyben a lombozat sárgulása, hullása intenzívvé vált a múlt héten, amely vélhetően környezeti stressz (pl. szárazság) következménye. A **blumeriellás levélfoltosság** fellépése már megfigyelhető, de a betegség egyelőre alacsony szintű.

Dióban a **dióburok-fúrólégy** rajzása intenzív, tömeges 130-170 db imágó/csapda/hét fogással a csapdákbán. Az alsó terméseken még nem láthatóak szúrásnyomok (a felsőkön viszont már valószínűsíthető). További védelem javasolt.

SZŐLŐ

Növényfenológia: zsendülés kezdete-zsendülés, korai fajták érés.

Szőlőben a **lisztharmat** levéltünetei erősödtek gyenge-közepes fertőzöttség jellemző (2-4-es fokozat), a lombozat növekvő, ~20-30 %-a fertőzött góc-szerűen. A tünetek fellépése a fejletlenebb fürtökön gyakori és erős mértékű (elsősorban házi kertben). A fertőzött felületeken a kazmotéciumok képződése, fejlődése megindult.

A további meleg, száraz időjárás nem kedvezett a **peronoszpóra** újabb fertőzéséhez és a tünetek erőteljesebb kialakulásához. Emellett egy-egy érzékeny fajtában a lombon a betegség lassú erősödése látható.

A heves zivatarok (helyenként jég) és az egyszerre nagy mennyiségben lehullott eső a bogyók hirtelen növekedését, felrepedését eredményezheti, amely kedvez a **botrítisztes fertőzés** kialakulásának. A betegség ellen a kritikus időszakban a védelem javasolt.

Egyéb:

A színesedő bodzában megjelentek a **faltosszárnyú muslica** első egyedei. A csapdakehelyezés javasolt, a védekezésre fel kell készülni.

Zalaszentlőrinc, 2021. augusztus 16.

Tűh Annamária
előrejelző