

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2021.09.13-09.20.

Időjárás:

A múlt héten folytatódott a késő nyárias időjárás. Csapadék 2 nap hullott, összesen 30-33 mm mennyiségben. Nagy volt a napi hőingás, jelentősek voltak a hajnali páralecsapódások. A minimum hőmérsékletek 6,3-15,0 fok, a maximumok 19,2-28,6 fok között alakultak, az előző héthez hasonlóan voltak (átlag: 13,5-20,3 fok).

REPCE

A megye területén lehullott kisebb-nagyobb mennyiségű eső létfontosságú volt a repce állományoknak. A kelés intenzívvé vált, de a legtöbb táblán kisebb foltokban hiányos. Károsítók közül a **földibolhák** betelepődése egy-egy táblán (könnyen felmelegedő talajú táblán) továbbra is intenzív, de az esők a populáció gyors növekedését visszafogták. A kártételek (újabbak) gyenge mértékűek (1-5 %, 1-es skála). A **repcedarázs** rajzása folyamatos, 10-15 db imágó/csapda/hét mennyiséggel a sárgalapokon.

KUKORICA

Növényfenológia: Érés, valamint a rövid tenyészidejű hibridek betakarítása megkezdődött.

Károsítók:

Kukoricában a **kukoricamoly** második nemzedékének rajzása befejeződött. A kártételek nem növekedtek, a csőfertőzöttség technológiától függően változó, 1-4 % közötti. A lárvák lefelé vonulása a szárban már megfigyelhető.

A **fuzáriumos csőfertőzés** fellépése gyenge, a vadjárta területeken gócosan közepes mértékű, (2-3-as skálafokozat).

Az erdő melletti, közeli területeken továbbra is gyakori a **vadak** kártétele.

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), ALMA, DIÓ

Növényfenológia:

Szilva: érés;

Alma, körte: érés, betakarítás folyamatos;

Károsítók:

Csonthéjasokban a **keleti gyümölcsmoly** rajzása, szilvában a szilvamoly rajzása észlelési szintű.

Dióban csökkenő, alacsony számú-észlelési szintű a **nyugati dióburok-fúrólégy** rajzása (5-10 db imágó/csapda/hét). A termések feketedése, hullása folyamatos, mostanra intenzív. Folyamatos a fejlett lárvák talajba húzódása, bábózódása is.

Fokozódott a **gnomóniás és baktériumos betegségek** okán valamint az élettani eredetű lombhullás a diósokban.

SZŐLŐ

Növényfenológia: érés, szüret. A beltartalmi értékek kedvezően alakulnak.

Szőlőben a **lisztharmat** levéltünetei nem erősödtek a múlt héthez képest. A fertőzöttség általában gyenge mértékű, de házi kertben közepes-erős károsodás is jellemző, a termőtestek fokozott képződésével.

A **peronoszpóra** fertőzés lombon (érzékeny fajtán) a múlt héten nem emelkedett.

A **botrítisztes fertőzés** veszélye továbbra is magas az érő-betakarítás alatt lévő szőlőben. A fertőzöttség a lisztharmattal, szőlőmollyal korábban már fertőzött ültetvényekben összességében gyenge fokozatú (1-5 %-os fürt fertőzöttség), de a fertőzés gyakorisága növekvő (helyenként 25-46 %-os). A darazsak és madarak kártétele mellett a **poloskák** jelenléte is intenzív és folyamatos (főleg L2-L5-ös fokozatok/ ~átlagosan 0,5-1 db poloska/fürt gócosan)). Kártételük és jelenlétük nemcsak az érett, hanem a még éretlen (későbbi szüretelésű) fajtákon is jellemző (pl. Olasz rizling) (1. fotó).



1. fotó: Ázsiai márványos poloska (L5-ös lárva) szőlőn

Zalaszentlőrinc, 2021. szeptember 20.

Tűh Annamária
előrejelző