

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2021.10.18-10.25.

Időjárás:

A múlt héten folytatódott a mérsékelt hűvös (ilyenkor megszokott) időjárás. Az éjszakai lehűléshez képest (-3-+11,2 fok) a nappali felmelegedés még mindig jelentősebb volt (8,5-18,3 fok között), így folytatódhatott a búza vetés, a kukorica betakarítás.

Csapadék csak egy nap hullott, 8-10 mm mennyiségben a megyében, így ez a még hátramaradó vetési munkákat nem akadályozta.

REPCE

Fenológia: átlag 6 leveles állapot.

A repce állományok szépen beálltak, fejlettségük a táblák túlnyomó többségén elérte az ilyenkor kívánatosat. Néhány későbbi vetésű táblán lehet látni kisebb-nagyobb mértékű kelés hiányt, fejletlenebb növényeket, de ez utóbbi az időjárás függvényében még orvosolható.

Károsítók:

Károsítók közül a **levéltetvek** betelepődése nem erősödött, már csak egy-egy táblán lehet látni gyenge fertőzöttséget. Amennyiben beáll az ilyenkor szokásos lehűlés, már biztosan nem lesz szükség beavatkozásra.

A **kis káposztalégy** rajzása minimálisra csökkent, a kezdeti kártételi tünetek már megfigyelhetők, de egyelőre csak a növények kihúzásával, a gyökerek vizsgálatával (a lombozaton lilás elszíneződés még nem látszik a kártétel következtében).

A **repce peronoszpóra** tünetei az érzékeny fajtákon/hibrideken továbbra is megfigyelhetőek, de számottevő erősödés nem látható az állományokon (2-3-as skála).

A **fómás levélfoltosság** tünetei az állományokban gyakoribbá váltak (érzékeny hibridekben), de a fertőzöttség legfeljebb gyenge mértékű maradt.

Az állományok **regulátoros/gombaölőszeres kezelése** még elvégezhető, az azol tartalmú készítményekkel legalább 10-12 fok feletti hőmérsékleten érhetünk el megfelelő hatást. A repce telelés előtti fejlettsége akkor optimális, ha legalább 6(8) leveles az állomány, ~6-8 cm hosszúságú a gyökérzet és annak vastagsága sem kevesebb mint 7-8 mm. A gyengén fejlett állományokat **gyökeresedést elősegítő lombtrágyával** (B, P, Zn tartalmú) célszerű még permetezni, hogy megfelelően megerősödjön a növények a télbe.

ŐSZI ÁRPA, ŐSZI BÚZA

Növényfenológia: árpa: 3(5) leveles állapot; búza: vetés, kelés.

Károsítók:

Árpában a **levéltetvek** betelepődése stagnáló, a legtöbb esetben csökkenő tendenciájú. A különböző **levélfoltosságok** tünetei az állományok érzékenységeinek függvényében gyakoribbá váltak, de a fertőzöttség mértéke gyenge maradt. Védelem ellenük nem indokolt.

Őszi árpában és őszi búzában a gyomösszetételtől és a kultúrnövény fejlettségétől függően folyamatosan végezhető a korai poszt, őszi búzában a **preemergens gyomirtások**.

Egyéb:-

Zalaszentlőrinc, 2021. október 25.

Tühs Annamária
előrejelző