

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2022.08.01-08.08.

Időjárás:

A múlt héten folytatódott a meleg, száraz időjárás a megyében. A lehülés csak a hétvégére érkezett, csapadék pedig csak helyenként hullott kis mennyiségben, nyomokban.

A nappali hőmérsékletek 25,0-35,0 fok az éjszakai 14,1-16,7 fok között alakultak.

A páratartalom újra süllyedt, 48-55 % között volt mérhető.

KUKORICA

Növényfenológia: szemfejlődés, tejesérés.

Kukoricában folytatódott a növények felszáradása (alsó 5-7 levél).

A kukoricamoly második nemzedékének rajzása folyamatos, táblánként változó erősségű, 3-18 db imágó/csapda/3 nap közötti fogással a fénycsapdákbán. A gyapottok bagolylepke rajzása, kártétel nem észlelhető a térségben.

A monokultúrás táblákon a kukoricabogár rajzása folyamatos, tovább mérséklődött (egyszeri állományvédelem után), 25-55 db imágó/csapda/2 nap fogással a csapdákbán.

NAPRAFORGÓ

Növényfenológia: zöldérés-citromérés kezdete.

Napraforgóban nem következett be jelentős változás a múlt héthez képest.

Napraforgóban a **poloskák** száma és kártétele nem változott, legfeljebb észlelési szintű.

Az alsó levelek felszáradása folyamatos, a legtöbb esetben az alsó 8-10 levél felszáradása jellemző.

Az **alternáriás levél-és szárfoltosság** tünetei nem erősödtek (az alsóbb leveleken nehéz elkülöníteni az élettani foltosodástól). A szárok és a tányérok is egészségesek.

BURGONYA

Növényfenológia: gumónövekedés.

A burgonya állományok felszáradása, összeroskadása folyamatos.

Burgonyában a **burgonyabogár** idős lárvaformázatai továbbra is fellelhetők házi kertben egy-egy tövön, 8-10 db lárva/tő mennyiségben (1. fotó). A későbbi szedésű burgonya fajták esetében a védekezés javasolt a kártevők ellen az élelmezés egészségügyi várakozási idők betartása mellett.

Az **alternáriás levélfoltosság** tünetei már a felső leveleken is megfigyelhetők, gyenge-közepes mértékben (2. fotó). Az alsó leveleken az élettani száradással együtt van jelen a betegség.

A **burgonyavész** fertőzésnek kevésbé kedvezett a múlt heti időjárás, sőt a korábbi esetleges fertőzésből is alig sejthetők tünetek. Legfeljebb gyenge fertőzöttség valószínűsíthető.



1. fotó: Burgonyabogár idős lárvái erős mértékű kártétel mellett (2022.08.08.)



2. fotó: Alternáriás levélfoltosság a burgonya felső levelein (2022.08.08.)

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), ALMA, DIÓ

Növényfenológia:

Szilva: érés kezdete;

Cseresznye, meggy, kajszi: betakarítás utáni állapot;

Alma, körte: termés növekedés, színeződés, nyári fajták érése;

Károsítók:

Almában az **almamoly** rajzása folyamatos, a múlt héthez képest kissé csökkenő egyedszámmal (8-19 db imágó/csapda/3 nap). A védekezés javasolt.

Az **almalevél-aknázómoly** rajzása csökkent, gyenge intenzitású (10-12 db imágó/csapda/3 nap). A kártétel gyenge mértékű.

Almában a **varasodás, lisztharmat** újabb (mérhető) fertőzése, tünete nem alakult ki, a magas hőmérsékleti értékek nem kedveztek a betegségek terjedéséhez.

Cseresznyén a **blumeriellás levélfoltosság** újabb tünetei jelentek meg, a fertőzöttség erősödött, a levelek hullásával egyidejűleg.

Az érő gyümölcsökön folyamatos (pl. szilván, almán, körtén, őszibarackon) a darazsak és az ázsiai katicabogarak kártétele, főleg házi kertben.

A **szilvamoly** rajzása folyamatos, stagnáló, 30-34 db imágó/csapda/3 nap mennyiséggel a csapdákból. A védekezés javasolt, az élelmezés egészségügyi várakozási idők figyelembe vétele mellett. Csonthéjasokban a **keleti gyümölcsmoly** rajzása újra folyamatos, stagnáló-kissé csökkenő, 27-41 db imágó/csapda/3 nap fogással.

Dióban a múlt héten kissé erősödött a **nyugati dióburok-fúrólégy** rajzása (az egyszer már permetezett ültetvényekben, fákban), de tömeges fogás a kevésbé védett fák környezetében sem volt (6-15 db imágó/csapda/3 nap). A csapda fogások alapján javasolt az újabb védekezés!


SZŐLŐ

Növényfenológia: korai fajták érés kezdete, érés.

Szőlőben továbbra is folyamatos, tömeges (permetezetlen ültetvényben) az **amerikai szőlőkabóca** rajzása (15-20 db imágó/csapda/hét). A sárgalapok ellenőrzése javasolt.

A vektor elleni védekezés továbbra is indokolt a fertőzött ültetvényekben az élelmezés egészségügyi várakozási idők betartása mellett.

Az elmúlt időszak egy-két esős napjának a következményei megfigyelhetők a kevésbé permetezett ültetvényekben, kertekben. Újabb **peronoszpóra** tünetek figyelhetők meg a hajtásvégi, illetve hónaljajtások fiatal levelein (3. fotó).



3. fotó: Szőlőperonoszpóra új tünetei levélen (piros: régi tünet sporulálással, kék: újabb tünet-olajfolt) (2022.08.08.)

A fertőzöttség növekvő, de a védett kertekben legfeljebb gyenge mértékű.

A **lisztharmat** levél tüneteinek erősödése a betegségre érzékeny fajtákon jellemző. A kazmotéciumok képződése folyamatos a fertőzött levélfelületeken. A betegségek ellen lehetőség szerint további védekezés javasolt.

Zalaszentlőrinc, 2022.08.08.

Tűh Annamária
előrejelző