

Károsítóhelyzet alakulása

Zala megye, 2022.08.22-08.29.

Időjárás:

A múlt héten folytatódott a csapadékosabb, mérsékelt meleg időszak Zala megyében. Eső 5-6 nap esett, összesen 40-45 mm mennyiségben. A hőmérsékleti értékek átmenetileg csökkentek majd ismét a 28-31 fokos tartományban mozogtak (minimum: 14,5-17,9 fok; maximum: 18,4-31,9 fok; átlag: 16,1-23,8 fok). A páratartalom (75 % és fellette) valamint a levélnedvesség időtartam is emelkedett (2,5-14 óra).

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA, REPCE

A repce alá folyamatosak a talaj előkészítések, ahol lehetett már megkezdtek a vetést. A **gabona árvalélések** átlagosan 3 leveles állapotúak. A bolhák népszerűsége és kártétele nem növekedett, gyenge mértékű. Megjelentek a levéltetvek a 3 leveles növényeken, a növények ~40 %-án láthatók egyes egyedek.

KUKORICA

Növényfenológia: sárgaérés-teljes érés.

A **kukoricamoly** második nemzedékének rajzása szakaszos, újabb enyhén emelkedő egyedszámmal. A fénycsapda fogása 5-8 db imágó/csapda/3 nap.

A **kukoricabogár** rajzása tovább mérséklődött, a növényekről szinte eltűntek. A csapda fogások nem jelentősek.

A **fuzáriumos csőfertőzés** fellépése állomány szinten ~1 % körüli, gyenge fertőzöttség mellett.

NAPRAFORGÓ

Növényfenológia: teljes érés.

Napraforgóban –több táblán- megkezdtek, elvégezték az állományszárításokat (a víztartalmak a szárított állományokban kedvezően alakulnak -7% körül). Ezeken a táblákon a károsítók fellépése már jelentéktelen, kivéve a madarak kártételét.

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), ALMA, DIÓ

Növényfenológia:

Szilva: érés-betakarítás, cseresznye, meggy, kajszi: betakarítás utáni állapot;

Alma, körte: színeződés, érése, betakarítás;

Dió: korai fajták esetén burok felrepedése, érés

Károsítók:

Almában az **almamoly** rajzása folyamatos, az előző héthez növekvő, 15 db imágó/csapda/4 nap mennyiséggel. A védekezés legfeljebb a késői fajtákban javasolt.

Az **almalevél-aknázómoly** rajzása csökkent, 13 db imágó/csapda/4 nap fogással.

Almában, körtében a darazsak, illetve egyéb rovarkártételek nyomán a **moniliás betegség** közepes mértékű fellépése látható a gyümölcsök ~1-2 %-án. Védekezés legfeljebb a késői fajtákban lehetséges.

A **szilvamoly** rajzása erősödött, 40 db imágó/csapda/4 nap mennyiséggel a csapdákbán. A szilva hullása folyamatos, a fertőzöttség emelkedő ~3-8 %-os. Védekezés legfeljebb a késői fajtákban javasolt, az élelmezés egészségügyi várakozási idők figyelembe vétele mellett.

Csonthéjasokban a **keleti gyümölcsmoly** rajzása is növekvő, 42 db imágó/csapda/4 nap fogással.

Meggyben, cseresznyében erősödött a **sztigminás levéllyukacsosodás** fellépése. A fertőzöttség gyenge mértékű de emelkedő (2-es fokozat). A lombzat sárgulása és élettani eredetű hullása felgyorsult, intenzív.

Dióban a csapadékos napokat követően kissé emelkedett a **nyugati dióburok-fúrólégy** rajzása. A sárgalapok fogása 7-26 db imágó/csapda/hét. Védekezés legfeljebb a késői fajtákban lehet szükséges, az élelmezés egészségügyi várakozási idő betartása mellett.

SZŐLŐ

Növényfenológia: érés -szüret

Szőlőben a csapadékos napokon nő a **botrítisz** fertőzésveszélye. A betegség fellépését elősegíti a bogyóhéj vékonyodása, a kialakult kártételek (szőlőmolyok, darazsak, lisztharmat). A megelőző védekezés a késői fajták esetében indokolt.

Az esős napokat követően a páratartalom emelkedésével az eddig kialakult **peronoszpórás** foltokon tömegesen jelentek meg a sporangiumok, melyek a hónaljajtások fiatal levelein még kiterjedt új tüneteket okozhatnak (az idős leveleken most már inkább csak mozaikos foltokat). A betegségekre érzékeny fajták lombzatán a betegség erősödésére számíthatunk. Védekezés szüret után javasolt.

A **lisztharmatra** érzékeny fajták lombzatán a betegség tünetei növekedtek. Ilyen esetekben gyakori a 70-100 %-os lombfertőzöttség is. A lisztharmatos felület mikroszkópikus vizsgálata során a termőtestek (kazmotéciumok) lassú és kis számú képződése volt megfigyelhető. A vizsgált leveleken szinte csak citromsárga (éretlen) termőtestek voltak láthatóak. A magas páratartalom igen, míg az esős napok nem kedveznek a betegség terjedéséhez és a kazmotéciumok tömeges képződéséhez sem, így remélhetőleg a betegség lassabb lombon történő felszaporodása várható.

A fogékony fajtákon (pl. Néró) megjelent a **foltosszárnyú muslica** elsődleges kártétele a bogyókon. A kártevő előrejelzése vörösboros, almaecetes csapdával valamint szükség esetén a védekezés javasolt.

Zalaszentlőrinc, 2022. augusztus 29.

Tűh Annamária
előrejelző