

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2022.08.29-09.05.

Időjárás:

A múlt héten változékony, mérsékelt meleg, helyenként csapadékos időjárás volt jellemző a megyében. Eső 1-2 nap esett, összesen 10-14 mm mennyiségben. A hőmérsékleti értékek kissé csökkentek (minimum: 9,1-15,4 fok; maximum: 21,6-27,2 fok; átlag: 16,8-21,1 fok). A páratartalom (75 % és fellette) valamint a levélnedvesség időtartam is emelkedett a csapadékos napok környezetében (5-6 óra).

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA, REPCE

A repce alá folyamatosak a talaj előkészítések, a vetés. A talaj megfelelő állapotú a munkákhoz.

A **repce árvakelések** 2-4 leveles állapotúak, azokon a bolhák létszáma és kártétele gyenge de a fejlettebb állományokból szinte eltűntek. A repcedarázs népessége alacsony szintű, a kártétel észlelési szintű. A különböző bagolylepke-fajok lárváinak kártétele szintén gyenge mértékű.

A **gabona árvakelések** átlagosan 3 leveles állapotúak. A bolhák népessége és kártétele nem növekedett, legfeljebb gyenge mértékű. A levéltetvek lassú felszaporodása megfigyelhető, a növények ~40-50 %-án láthatók egyes egyedek.

KUKORICA

Növényfenológia: sárgaérés-teljes érés.

A **kukoricamoly** második nemzedékének rajzása szakaszos, csökkenő (0-2 db imágó/fénycsapda/2 nap). A kártétel nem növekedett az előző héthez képest.

A **kukoricabogár** rajzása tovább mérséklődött, a növényekről szinte eltűntek. A csapda fogások nem jelentősek.

A **fuzáriumos csőfertőzés** fellépése állomány szinten kissé növekedett (elsősorban rovar-és vadkártételek nyomán) 1-2 % körüli, gyenge fertőzöttség mellett.

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), ALMA, DIÓ

Növényfenológia:

Szilva: érés-betakarítás, cseresznye, meggy, kajszi: betakarítás utáni állapot;

Alma, körte: színeződés, érés, betakarítás;

Dió: korai fajták esetén burok felrepedése, érés

Károsítók:

Almában az **almamoly** rajzása folyamatos, az előző héthez képest csökkenő, 5-6 db imágó/csapda/4 nap mennyiséggel.

Az **almalevél-aknázómoly** rajzása észlelési szintűre csökkent.

Almában, körtében a monília betegség közepes mértékű fellépése látható a gyümölcsök növekvő ~1-3 %-án. Védekezés legfeljebb a késői fajtákban lehetséges.

A **szilvamoly** rajzása jelentősen gyengült, 5-10 db imágó/csapda/4 nap mennyiséggel a csapdákból. Szilvában a **monília gyümölcsfertőző** emelkedő szintű, a gyümölcsök ~3-5 %-a fertőzött. Védekezés legfeljebb a késői fajtákban lehetséges.

Csonthéjasokban a **keleti gyümölcsmoly** rajzása csökkenő, 9-12 db imágó/csapda/4 nap fogással.

Meggyben, cseresznyében a **sztigminás levéllyukacsosodás** fellépése nem erősödött a múlt héthez képest. A fertőzőtség gyenge mértékű (2-es fokozat). Ezzel szemben a **blumeriellás betegség** feljövőben van, gyenge, de házi kertben helyenként közepes fertőzőtség is elfordul. A lombozat sárgulása és a betegségek mellett élettani eredetű hullása felgyorsult, intenzív, 30-60 % közötti.

Dióban a csapadékos napokat követően kissé emelkedett a **nyugati dióburok-fúrólégy** rajzása (az elmúlt hetekhez képest). A sárgalapok fogása így is alacsony 5-11 db imágó/csapda/hét. Védekezés már nem javasolt, részben az élelmezés egészségügyi várakozási idő hossza (legkevesebb 14-21 nap) részben az alacsony számban lerakott tojásokból kelő kis lárvák minimális kártétele miatt.

SZÓLÓ

Növényfenológia: érés -szüret

Szőlőben a csapadékos napokon nőtt és várhatóan növekedni is fog a **botrítisz** fertőzésveszélye. A betegség a tömött fürtű, érő fajtákban helyenként gyenge-közepes mértékűre erősödött (2-3-as fokozat). A megelőző védekezés a késői fajták esetében még elvégezhető.

A **peronoszpórás** foltokon a sporangiumok megjelenése tömeges. Az egyszer-egyszer előforduló esők, a reggeli-éjszakai harmatképződés a magas páratartalom és a hőmérséklet is kedveznek a betegség számára. A betegségre érzékeny levelű fajtákban helyenként már 40-70 %-os felületi fertőzőtség is tapasztalható, nemcsak a fiatal hanem az idős levelek érintettségével.

A **lisztharmat** érzékeny fajták lombozatán a betegség tünetei növekedtek, de inkább a betegség gyakoriságában látszik növekedés. Gyakori a 70-100 %-os lombfertőzőtség.

Egyéb: A **mezei pocok** lassú felszaporodása figyelhető meg a ruderalis területeken, tábla széléken.

Zalaszentlőrinc, 2022. szeptember 5.

Tűh Annamária
előrejelző