

Károsítóhelyzet alakulása
Zala megye, 2022.09.19-09.26.

Időjárás: A múlt héten folytatódott a változékony, hűvösebb, már inkább őszire hasonlító időjárás. Eső 3-5 nap esett, összesen 20-25 mm mennyiségben. A hőmérsékleti értékek hasonlóak voltak az előző héthez, a minimum: 2,9-12,4 fok; maximum: 12,8-20,5 fok; átlag: 10,0-13,3 fok között alakultak. Az éjszakai lehűlés továbbra is jelentős volt.

REPCE

A repce állományok fejlődése kissé lassult, stagnál. Az állományok nagy része 2 valódi leveles állapotú.

A **repce árvakelések** nagy részét gruberezték/tárcsázták, de a táblákon viszonylag épen maradt növényeken megfigyelhetők még a kártételek. A bolhák kártétele jelentős, erősödött. Repcedarázs kártétel nem vagy legfeljebb minimális látható. Az imágók egyedszáma is minimálisra csökkent.

A fővetésű **repce táblákon** a **repcebolha** egyedszáma nem erősödött, a napsütéses órákban ~30-40 %-os állomány fertőzöttség mellett átlagosan 1 db imágó/növény mennyiségben láthatók. A kártétel sem növekedett, gyenge mértékű maradt (1-es skála, 1-5 %).

Az esős, borongós napok nem kedveznek a felszaporodásnak, kártételnek így annak erősödése a repce fejlődésével egyidejűleg már nem valószínű.

Betegségek közül megjelentek a **fómás levélfoltosság** és a **repce peronoszpóra** tünetei az állományokban. A tünetek főleg a szikleveleken láthatóak. A repce peronoszpóra esetében a levél fonákon gyenge sporangium kiverődés, míg a fómánál a „kezdetleges” piknídiumok nagyító/mikroszkóp alatt már megfigyelhetők (1. fotó).



1. fotó: Fómás levélfoltosság és repce peronoszpóra tünetek a repce sziklevelén
(Tűh A. 2022.09.26.)

A gyomnövények kelése, fejlődése is lassult. Folyamatos a veronika-félék, a mezei árvácska, a tyúkhúr, a libatop-félék, a disznóparéj és a mezei acat kelése (2-3. fotó). A gabona árvakelések kelése is folyamatos, legfeljebb 1-2 leveles állapotúak. Gyom összetételtől függően a **korai poszt-posztemergens** kezelésekre fel kell készülni.



2-3. fotó: Kelő gyomnövények repcében (Tüh A. 2022.09.26)

SZŐLŐ

Növényfenológia: szüret-szüret vége

Szőlőben a szüret az időjárástól függően folyamatos és egyben sürgető is. A csapadékos napokat követően tovább erősödött a **botritiszes fürtfertőzés** erőssége az érzékeny fajtájú ültetvényekben. Emellett a madarak és most már csak kisebb kártételi veszéllyel a darazsak is dézsmálják a termést, ezért mielőbbi szüret javasolt.

A **peronoszpóra és lisztharmat** fertőzőtlenség nem változott jelentősen a múlt héthez képest. A szüret után és lehetőség szerint a lombhullás első szakaszától a lemosó permetezések tervezhetők.

Egyéb: A **mezei pocok** felszaporodása viszonylag mérsékelt a megyében. Szántóföldi területeken (repce táblák szélein, ruderalis területeken) gyenge fertőzőtlenség tapasztalható (átlagosan 1 db lakott járat/100 m²). Szőlő-gyümölcskultúrákban valamivel magasabb fertőzőtlenséget látni 1-2 db lakott járat/100 m² mennyiségben.

Zalaszentlőrinc, 2022. szeptember 19.

Tüh Annamária
előrejelző