

## Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2022.09.26-10.03.

**Időjárás:** A múlt héten esős, borongós, hűvös idő volt jellemző a megyében. Eső szinte minden nap esett, összesen 55-60 mm-nyi mennyiségben, amely továbbra is lehetetlenné tette a napraforgó, kukorica, szója betakarítását (befejezését), valamint az őszi árpa vetését, talaj előkészítését. A hőmérsékleti értékek hasonlóak voltak az előző héthez, annyi különbséggel, hogy a minimumok emelkedtek: 8,0-12,1 fok között alakultak, a maximumok: 13,7-19,6 fok; átlag: 11,5-14,5 fok között változtak.

### REPCE

A repce állományok fejlődése általában stagnál, legfeljebb lassú „lombosodás” látható. Egy-egy tábla (és/vagy a megye déli-délnyugati részén lévő állományok) fejlettsége viszonylag előre haladott, 4 valódi levelek. Az állományok nagy része 2 (3) valódi leveles állapotú.

A fővetésű **repce táblákon** a **repcebolha** egyedszáma kissé erősödött, a napsütéses órákban 1-4 db imágó/növény mennyiségben láthatók. A kártétel gyenge mértékű maradt (azzal együtt, hogy több táblán állományban is védekeztek a kártevő ellen).

A **repcedarázs** rajzása továbbra is csupán észlelési szintű (1 -2 db imágó/csapda/1 hét). Szintén észlelési szintű a lárvák megjelenése (L2), kártétele is. A hetek óta jellemző alacsony népesség miatt a kártétel erősödése sem valószínű.

Betegségek közül a **főmás levélfoltosság** és a **repce peronoszpóra** tünetei legfeljebb gyenge mértékben léptek fel az állományokban. A csapadékos, párás napok kedveznek az újabb fertőzéseknek ezért a betegségre való érzékenység függvényében szemléljük a táblákat.

A repce jelenlegi fejlettsége még nem indokolja, de a fejlettebb állományok esetén már célszerű tervezni a regulátoros kezeléseket, mellyel egyben a gomba betegségek ellen is védelmet nyújthatunk.

### KUKORICA

**Növényfenológia:** érés-betakarítás.

A jelenlegi csapadékos idő nem kedvez a kukorica érésének a víztartalom csökkenésének. Sajnos a felázott talaj miatt a földekre sem lehet rámenni, így tovább fokozódik a **fuzáriumos csőfertőzöttség** és a **vadak kártétele** az állományokban.

### SZŐLŐ

**Növényfenológia:** szüret-szüret vége

Szőlőben a szüret a vége felé tart. Ahol (pl. időjárás miatt) megkésték a szürettel, ott jelentős a **madarak, darazsak** kártétele illetve a **botritisz** fellépése.

A **peronoszpóra** és **lisztharmat** fertőzöttség nem változott jelentősen a múlt időszakhoz képest. Az érzékeny fajtákban a lomb károsodása házi kertben jelentős. A szüret után és lehetőség szerint a lombhullás első szakaszától a lemosó permetezések tervezhetőek.

A fertőzött ültetvényeket még célszerű átjárni **fitoplazmás** tüneteket keresve, a tőkét megjelölni és/vagy kivágni amint lehet. A levéltünetek még jól felismerhetők és emellett már jól elkülöníthetők az éretlen (zöld) vesszők az egészséges „társaiktól”.

Zalaszentlőrinc, 2022. október 3.

Tűh Annamária  
előrejelző