

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2022.10.03-10.10.

Időjárás: A múlt héten többnyire száraz, napos időjárás uralkodott a megyében. Eső 1(2) nap hullott, ~10 mm mennyiségben az időszak elején.

A hőmérsékleti értékek összességében hasonlóak voltak az előző héthez, annyi különbséggel, hogy a minimumok csökkentek: 4,4-9,6 fok között alakultak, a maximumok: 17,5-22,4 fok; átlag: 11,6-14,4 fok között változtak.

REPCE

Fenológia: átlag 4 leveles állapot.

A repce állományok fejlődése folyamatos, a múlt héthez képest kissé erősödött. Helyenként már a 6 valódi levelet is eléri a fejlettség. Egy-egy táblán már megfigyelhető a nagyobb levelek részleges antociános elszíneződése, mely valószínűsíthetően a talaj tömörödése, csökkent tápanyag felvétel miatt (N, P) alakulhatott ki (a gyökéren, gyökérnyaki részen kártétel nem látható).

A későn vetett állományokban a **repcebolha** egyedszáma csökkent, de kártétele erősödött (1. fotó). A kártételi veszély azonban a repce fejlettsége és az állomány kezelése miatt mostanra minimálisra csökkent.



1. fotó: Repcebolha kártétel későn vetett repcén (2022.10.10.)

A **repcedarázs** rajzása a sárgalapos csapdázással nem észlelhető az állományokban. A lárvák kártétele minimális volt, az egyszer már rovarölözött állományokban pedig nem is észlelhető. Észlelési szinten megjelentek a **levéltetvek** az állományokban.

A **fómás levélfoltosság** tünetei erősödtek a repce alsó levelein, de a fertőzöttség még így is gyenge fokozatú (2-es skála) (2. fotó). A repce állományok (különösen a betegségre érzékeny fajták/hibridek) őszi regulátoros/gombaölőszeres kezelése már tervezhető.

Repcében az **árvakelésű gabona** fejlődése folyamatos, 3-5 hajtás-bokrosodás állapotú (3. fotó). A szelektív egyszikű irtók kijuttatása javasolt és aktuális a gabona előveteményű állományokban.



2. fotó: Fokozódó fómás levélfoltosság tünetek repcén (2022.10.10.)



3. fotó: Gabona (őszi árpa) árvakelés repcében (2022.10.10.)

ŐSZI ÁRPA, ŐSZI BÚZA

Növényfenológia: őszi árpa: vetés folyamatban (legfeljebb egy-egy állomány kelése látható, de nem általános), őszi búza alá a talaj előkészítés folyamatos.

Az árvakelésű őszi árpán gyenge, érzékeny fajtán/hibriden közepes mértékű (3-as skála) a **hálózatos levélfoltosság** fellépése. Gyakori a betegség fellépése a tábla széli pázsitfű-féléken is.

Zalaszentlőrinc, 2022. október 10.

Tűh Annamária
előrejelző