

Károsítóhelyzet alakulása Zala megye, 2022.10.17-10.25.

Időjárás: A múlt héten folytatódott az előző időszakhoz hasonló, a szokásosnál kicsit melegebb időjárás. Eső 1-3 nap hullott, 5-7 mm mennyiségben.
A hőmérsékleti értékek összességében hasonlóak voltak az előző héthez, a minimumok: 6,8-9,1 fok között alakultak, a maximumok: 15,3-21,2 fok; átlag: 10,3-14,8 fok között változtak.
A köd-és páralecsapódás általános volt.

ŐSZI ÁRPA, ŐSZI BÚZA

Fenológia: Őszi árpa: csírázás (~20 %), kelés (~40 %), 1-3 leveles állapot (~40 %).
Az Őszi búza vetése folyamatban van.

Károsítók:

Az őszi árpa állományokban folyamatos a **levéltetvek** betelepődése. Az 1-3 leveles állományokban gyakorivá vált a kisebb-nagyobb kolóniák kialakulása. Gyenge-közepes fertőzöttség jellemző (Banks-féle skála: 2-3 fokozat), a populáció növekedése folyamatos.
Az időjárás előrejelzés továbbra is enyhe időt jósol, ezért a rovarölőszerrel még nem védett állományokban a védekezés időszerű és javasolt.
Az őszi árpa állományokban a **gyomnövények kelése** folyamatos (kamilla, tyúkhúr, keserűfű-félék stb.) (1. fotó). A korai poszt-posztemergens kezelésekre fel kell készülni.



1. fotó: Kelő gyomnövények őszi árpában (2022.10.24)

REPCE

Fenológia: 4-6 leveles állapot.

A repce állományok fejlődése a meleg időjárásnak (és a talaj nedvesség tartalmának) köszönhetően folyamatos. A korábban vetett állományok regulátoros kezelése általában már megtörtént, de a kedvező időjárás miatt a föld feletti részek növekedése továbbra is intenzív. Gyakori a 4-6 valódi (kifejlett) leveles állományokban a 30-50 cm-es növénymagasság (utóbbi a széles sortávú vetésekben jellemző).

Több, gabona előveteményű táblán foltszerűen, súlyos **drótféreg kártétel** alakult ki a gyökereken fejlett lárvastádiumok jelenlétével (2. fotó). Növényvédelmi beavatkozásra már nincs lehetőség a kártevő ellen, az állomány sorsáról, annak károsodása függvényében dönthetünk.

Hasonlóképp döntési kényszerbe kerülhetünk a **káposzta gyökérgolyvával** fertőzött területekkel kapcsolatban is (2. fotó). A közepes-erős fertőzöttség és/vagy az állományon belüli gyakori előfordulás esetén indokolt átgondolni az állomány sorsát, mert a betegség nemcsak termés kiesést okozhat, hanem teljes (befejezett) fertőzési ciklus esetén jelentősen növekedhet a fertőző anyag mennyisége is a talajban (a betegségre fogékony hibrid fertőzöttsége mellett).

Az eső, a páralecsapódások miatt, a hosszú ideig nedves állományban a **fómás levélfoltosság** terjedése valamint, a piknídiumok képződése a beteg foltokon folyamatos és tömeges. A jelenlegi körülmények kedveznek a betegség terjedéséhez ezért az érzékeny hibridekben/fajtákban indokolt a gombaölőszeres (regulátoros) kezelés.



2. fotó: Káposzta gyökérgolyva és drótféreg kártétel repce gyökerén (2022.10.25)

SZŐLŐ, GYÜMÖLCS

Házi kerti körülmények között a szőlő lombhullása (a fertőzött tőkéké) intenzívvé vált, ~60-90 %-os. Az érzékeny fajták lombozatán a lisztharmat általában közepes fertőzöttséggel van jelen az ültetvényekben, a peronoszpóra közepes-erős fertőzöttsége jellemző, mely helyenként idő előtti lombhullást eredményezett. Gyümölcsök közül a meggy, cseresznye lombhullása 80-100 %-os. Az alma betakarítása folyamatos a vége felé tart, a lombhullás ~10-30 %-os. A lemosó permetezések elvégzésére a fagyokig van még lehetőségünk (lehetőleg 5 °C feletti hőmérsékleten). Emellett nagyon fontos a gyümölcsmúmiák és a fertőzött növényrészek összegyűjtése is.

Zalaszentlőrinc, 2022. október 25.

Tűh Annamária
előrejelző