

Országos növényvédelmi előrejelzés a szántóföldi és kertészeti kultúrákban 2026.09.24.

A múlt héten folytatódott a mérsékelt meleg, száraz időjárás hazánkban. Az időszak elején a nappali hőmérsékletek még késő nyári értékeket súroltak, de egy hidegfrontnak köszönhetően újabb lehűlés érkezett. Jelentős mennyiségű esőt továbbra sem hozott. Általában 2-4 mm közötti csapadék hullott, valamivel nagyobb mennyiség az Alföld déli részén és az észak-keleti országrészben fordult elő. Talajaink továbbra is kedvezőtlen állapotban várják részben az esőt, részben hogy végre elvetésre kerüljenek a repce és az őszi gabonafélék. Sok helyen még mindig hántatlanok a repce és gabona tarlók és ahol munkára kényszerültek az egyébként már sürgető vetés miatt, poros vagy éppen durván rögzös talajfelszínnel és 5-15 V/V% talajnedvességgel (5-15 cm mélységben) kellett szembesülniük a gazdáknak (1. fotó).



1. fotó: Vetés száraz, rögzös talajba
(Fotó: Tunyoginé Búzás Ilona)

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

A repce vetését ugyan az ország több területén megkezdték már, de eső hiányában a kelés vontatott. A napsütéses napokon egy-egy táblán a **bolhák** nagyobb arányú betelepődése is megfigyelhető volt (de nem általánosan), így a hiányos kelés ellenére is szükségessé vált a rovarölőszeres állománykezelés. Az elvetett állományokba kihelyezett sárgalapokra tömegesen repültek különböző légy-fajok. A megnövekedett mennyiségből sejthető, hogy a **kis káposztalégy** rajzása is elkezdődhetett (pontos azonosítása speciális szakértelmet igényel), ezért az elvetett állományokban mindenképp javasolt a csapdákat kihelyezni (2. fotó).

KUKORICA/ NAPRAFORGÓ

A napraforgó betakarítása folyamatos, a dunántúli megyékben 70-80 %-os. A kukorica betakarítását az Alföldön nagyrészt befejezték, másutt folyamatban van, de ahol nem kezdték még meg, ott a napraforgó után rövidesen tervezik (Dunántúl).

Kukoricában a kukoricamoly imágóinak száma észlelési szintűre csökkent (1 db imágó/csapda/hét), gyakorlatilag befejeződött. A gyapottok bagolylepke szintén észlelési szinten csapdázzható (1-2 db imágó/csapda/hét), növényvédelmi jelentőségük már nincs.



2. fotó: Különböző légy-fajok, repcében kihelyezett sárgalapon (Fotó: TühA.)

KERTÉSZETI KULTÚRÁK

A kertészeti kultúrákban nem tapasztalható érdemi változás az elmúlt héthez képest.

Almában még mindig csapdázzható az **almalevél-törpemoly** (2 db imágó/csapda/hét) az **almalevél-aknázómoly** (19 db/csapda/hét) és helyenként az **almamoly** is, erősen csökkenő tendenciával, de inkább már csak észlelési szinten.

Szilvában a **szilvamoly** rajzása is enyhült (4-6 db imágó/csapda/hét) és őszibarackban is alacsony számban repültek a **keleti gyümölcsmoly** egyedei a feromon csapdákbá (5-8 db imágó/csapda/hét).

Szőlőben a **fitoplazmás** tőkék felderítése, kiiktatása a továbbiakban is alapvető fontosságú. Az **amerikai szőlőkabóca** rajzását az erőteljesen lehűlő időjárás jelentősen visszavetette. Az egyedszámok többnyire észlelési szinten mozognak a legtöbb területen (1-3 db imágó/csapda/hét).

A kései fajták szürete még tart, de a szüret nagyrészt befejeződött. A meleg, napsütéses napokon folytatódott a **szőlő lisztharmat** telepeinek mérsékelt terjedése, a beteg foltokon pedig a kazmotéciumok képződése. A folyamat lassú és szinte csak a betegségre kifejezetten érzékeny fajták levelein figyelhető meg. Ezen kívül csapadék hiányában az ez ideig megérett termőtestek lemosódása is még várhat magára.

Egyéb:

Kertészeti-és dísznövény kultúrákban folytatódott a **gyapottok bagolylepke** lárváinak kártétele és annak következtében a termések romlása (paradicsom).

Továbbra is megtalálhatók az **ázsiai márványos poloska** és a **zöld vándorpoloska** egyedei a kiskertekben de a betakarítás előtt álló szója táblákon is fellelhetők a lárvák, amelyek itt számottevő kárt már nem okoznak.

Tüh Annamária
Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamara

Az előrejelzés a Borsod –Abaúj-Zemplén (Szakolczai Soma), Csongrád-Csanád (Tunyoginé Búzás Ilona), Hajdú-Bihar (Gálóczi-Tömösváry Róbert), Jász-Nagykun-Szolnok (Pintér Imre), Komárom-Esztergom (Abdai Éva) és Zala vármegyei (Tüh Annamária) Növényorvosi Kamarák szakembereinek megfigyelései alapján készült.